

APOTEKSGUIDE

Ventizolve® (naloxon) 1,26 mg nässpray, lösning i endosbehållare

1) Allmän information till apotekspersonal

Ventizolve är avsett för akut behandling av känd eller misstänkt opioidöverdos som yttrar sig som andningsdepression och/eller depression av centrala nervsystemet, både i och utanför vårdinrättningar.

Ventizolve ersätter inte akut läkarvård.

Ventizolve är endast avsett för vuxna.

1 förpackning Ventizolve innehåller:

- En skyddsförpackning innehållande 2 nässprayer. Den andra nässprayeren är inkluderad för att kunna ge en andra dos av naloxon om det är nödvändigt.
- Skyddsförpackningen innehåller en snabbstartsguide med bilder som visar hur Ventizolve används.
- En bipacksedel med information om läkemedlet och steg-för-steg bruksanvisning.

2) Villkor för expediering av Ventizolve

Ventizolve är avsedd för expediering till patienter som riskerar överdos av opioider, samt deras vårdgivare (t.ex. vänner och familj).

3) Information som ska ges till kunden innan läkemedlet expedieras

- Informera kunden hur man **får tillgång till instruktionsvideon** med instruktioner hur Ventizolve används. Informera om QR-koden och URL-adressen (www.ventizolve.com) på kartongen och i bipacksedeln.
- Hänvisa till instruktionerna i videon och i bipacksedeln för **vad man ska göra** vid en misstänkt opioidöverdos.

- Säkerställ att kunden förstår vikten av att alltid **ringa ambulans först.**
Ring 112.
Säkerställ att kunden förstår hur Ventizolve **används på korrekt sätt.**
Ventizolve ersätter inte akut läkarvård.
Sprayen **ska inte laddas eller testas** före användning.
Vid applicering i näsborren aktiveras sprayen genom att trycka på kolven tills ett ”klick” hörs.
- Informera att personen som givit Ventizolve måste **stanna kvar hos patienten tills ambulans anländer.**
Hänvisa till instruktionsvideon och informationen i bipacksedeln.
- Säkerställ kunden är medveten om möjligheten för återfall i andningsdepression. Om ingen kliniskt signifikant effekt uppnås eller om tillståndet förvärras efter den första behandlingen kan **en ytterligare dos** ges efter 2–3 minuter.
- Informera kunden att **opioidabstinenssymtom** kan uppstå hos personer som är fysiskt beroende av opioider. Vissa personer kan uppträda aggressivt när de vaknar.
- Om kunden som köper Ventizolve har använt produkten tidigare och är bekant med dess användning, kan ovannämnda punkter behandlas mer kortfattat från fall till fall.