



LEIRAS

Leiras: a Takeda Company

NorLevo®

Akutpreventivmedel

NorLevo® 1,5 mg-tablett

Levonorgestrel

NorLevo® kan lämnas ut för under 15-åriga endast med läkarordination.

Dosering

1 tablett så snart som möjligt efter oskyddat samlag, helst inom 12 timmar men senast inom 72 timmar efter samlaget.

Effekt

Ju tidigare du tar tablett, desto bättre är effekten (95 % om tablett tas inom 24 timmar, 85 % om den tas inom 24–48 timmar och 58 % om den tas inom 48–72 timmar). Om tablett tas senare än 72 timmar efter samlaget är effekten inte känd. Det finns vissa belägg för att effekten av NorLevo kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas NorLevo fortfarande till alla kvinnor oavsett vikt och BMI.

De vanligaste biverkningar

Preparatet kan orsaka illamående, kräkningar, svindel, trötthet, huvudvärk, ömhet i bröstet, magsmärtor, fördröjd menstruation eller blödningsrubbningsar.

1
tabl.

Gå igenom följande punkter med kunden för att säkra att akutpreventivmedlet fungerar:

1. Försäkra dig om att kunden inte är allergisk mot något av preparatets innehållsämnen.
2. Ta reda på om kunden använder regelbunden medicinering eller har kroniska sjukdomar som kan påverka preparatets effekt.
3. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln som finns i förpackningen. NorLevo®-tabletten ska tas genast.
4. Preparatet kan orsaka övergående biverkningar.
5. Om kunden kräks inom tre timmar efter att hon tagit tabletten ska hon genast ta en ny tablett.
6. En normal menstruation är ett tecken på att akutpreventivmedlet sannolikt har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad eller blödningen är onormal är det bäst att göra ett graviditetstest. Om kunden är gravid ska hon kontakta en läkare eller rådgivningsbyrå.
7. I allmänhet behövs ingen efterkontroll. Eftersom NorLevo® är en tillfällig lösning kan det dock vara skäl att vända sig till en läkare för att skaffa en säker preventivmetod.
8. Preparatet ska inte användas upprepade gånger under samma menstruationscykel eftersom detta kan medföra störningar i cykeln.
9. Glöm inte bort kondomen: endast den skyddar mot könsjukdomar.

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

PB 1406, 00101 Helsingfors

www.leiras.fi



Leiras: a Takeda Company

366/14 O 10.2014