

alli™ (orlistaatti 60 mg kapselit)

Jos et ole varma, tarkasta seuraavat asiat ennen kuin myyt **alli™**a:

Asiakkaan on oltava:

- iältään vähintään 18-vuotias
- ylipainoinen (BMI \geq 28 kg/m²). Kysy asiakkaan pituus ja paino tarkastaaksesi BMI:n.

Neuvo **alli™**a ostavaa asiakasta:

- nauti vähärasvaisia aterioita, sillä liika rasva voi johtaa hoidon ruokavalioon liittyviin vaikutuksiin kuten ripuliin ja ilmavaivoihin
- ottamaan monivitamiinitabletti nukkumaan mennessä
- lisäämään fyysistä aktiivisuutta.

alli™a ei saa myydä asiakkaalle:

- **joka on alle 18-vuotias**
- **jonka BMI on alle 28 kg/m²**
- joka on raskaana tai imettää
- joka käyttää siklosporiinia
- joka käyttää varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä
- joka on allerginen (yliherkkä) orlistaatille tai valmisteen jollekin muulle aineelle
- jolla on kolestaasiksi kutsuttu maksasairaus (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt)
- jolla on ravinnon imeytymishäiriöitä (krooninen malabsorptiosyndrooma).

Erityiset varoitukset ja varotoimenpiteet:

Ennen kuin suosittelet **alli™**a asiakkaille neuvo asiakkaita ottamaan yhteys lääkäriin jos:

- he käyttävät amiodaronilääkitystä sydämen rytmihäiriöihin.
- he käyttävät diabeteslääkitystä.
- käyttävät epilepsialääkettä.
- heillä on munuaissairaus.
- he käyttävät kilpirauhaslääkettä (levotyroksiini).

Muistuta naisia, jotka käyttävät suun kautta otettavaa ehkäisyvalmistetta:

- käyttämään ylimääräistä ehkäisymenetelmää, jos he saavat vaikean ripulin.

Muistuta asiakkaasta myös:

- lukemaan pakkausselosteen ennen **alli™**n käyttöä
- **alli™**a ei saa ottaa useammin kuin kolme kertaa päivässä (yksi kapseli aterian yhteydessä)
- **alli™**a ei saa käyttää pitempään kuin kuusi kuukautta.