

Levodonna®

Jälkiehkäisyvalmiste

Levodonna 1,5 mg tabletti

levonorgestreeli

Annostus

1 tabletti mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin ja enintään 72 tunnin kuluessa yhdynnästä.

Teho

Valmisteen teho on sitä parempi, mitä nopeammin tabletti otetaan. Tehoa ei tunneta, jos valmistetta käytetään yli 72 tunnin kuluttua yhdynnästä.

Yleisimmät haittavaikutukset

Valmiste saattaa aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, huimausta, väsymystä, päänsärkyä, rintojen arkuutta, vatsakipua, kuukautisten viivästymistä tai vuotohäiriöitä.

Jotta jälkiekäisy onnistuisi, käy asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:

1. Varmista, ettei asiakas ole allerginen jollekin valmisteen ainesosalle.
2. Kysy, käyttääkö asiakas säännöllistä lääkitystä tai onko hänellä kroonisia sairauksia, jotka saattavat vaikuttaa valmisteen tehoon tai annostukseen.
3. Pyydä asiakasta lukemaan pakkauksen mukana oleva pakkausseloste. Levodonna-tabletti on otettava heti.
4. Valmiste voi aiheuttaa ohimeneviä haittavaikutuksia.
5. Jos asiakas oksentaa kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, hänen on otettava uusi tabletti heti.
6. Normaalit kuukautiset ovat merkki siitä, että jälkiekäisy on todennäköisesti toiminut. Jos kuukautiset ovat yli 5 päivää myöhässä, on syytä tehdä raskaustesti. Jos asiakas on raskaana, tulee hänen ottaa yhteyttä lääkäriin tai neuvolaan.
7. Koska Levodonna on tilapäisratkaisu, voi lääkärissä käynti olla paikallaan varman ehkäisymenetelmän hankkimiseksi. Kun kyseessä on nuori asiakas, ohjaa hänet lääkärille hakemaan ehkäisyneuvontaa.
8. Valmistetta ei tulisi käyttää toistuvasti saman kuukautiskierron aikana, sillä kierto saattaa häiriintyä.
9. Kondomin käyttöä ei kannata unohtaa: vain se antaa suojaa sukupuolitauteja vastaan.