

Levodonna[®]

Akutpreventivmedel

Levodonna 1,5 mg tablett

levonorgestrel

Dosering

1 tablett så snart som möjligt efter oskyddat samlag, helst inom 12 timmar men senast inom 72 timmar efter samlaget.

Effekt

Ju tidigare tabletten tas, desto bättre är effekten. Om tabletten tas senare än 72 timmar efter samlaget är effekten inte känd.

De vanligaste biverkningarna

Preparatet kan orsaka illamående, kräkningar, svindel, trötthet, huvudvärk, ömhet i bröstet, magsmärtor, fördröjd menstruation eller blödningsrubbingar.

Gå igenom följande punkter med kunden för att säkra att akutpreventivmedlet fungerar:

1. Försäkra dig om att kunden inte är allergisk mot något av preparatets innehållsämnen.
2. Ta reda på om kunden använder regelbunden mediciner eller har kroniska sjukdomar som kan påverka preparatets effekt eller dosering.
3. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln som finns i förpackningen. Levodonna-tabletten ska tas genast.
4. Preparatet kan orsaka övergående biverkningar.
5. Om kunden kräks inom tre timmar efter att hon tagit tabletten ska hon genast ta en ny tablett.
6. En normal menstruation är ett tecken på att akutpreventivmedlet sannolikt har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad eller blödningen är onormal är det bäst att göra ett graviditetstest. Om kunden är gravid ska hon kontakta en läkare eller rådgivningsbyrå.
7. Eftersom Levodonna är en tillfällig lösning kan det vara skäl att vända sig till en läkare för att skaffa en säker preventivmetod. När det är fråga om en ung person ska hon uppmanas kontakta läkare för preventivrådgivning.
8. Preparatet ska inte användas upprepade gånger under samma menstruationscykel eftersom detta kan medföra störningar i cykeln.
9. Glöm inte bort kondomen: endast den skyddar mot könssjukdomar.