

Orlistat Sandoz®

egenvårdspreparat som kräver
ytterligare rådgivning

Orlistat Sandoz 60 mg hård kapsel, orlistat

Om du är osäker, **kontrollera följande**
innan du säljer Orlistat Sandoz:

Kunden måste vara:

- 18 år eller äldre
- överviktig ($BMI \geq 28 \text{ kg/m}^2$). Fråga kunden om längd och vikt för att kontrollera BMI.

Ge följande råd till kunder som köper Orlistat Sandoz:

- ät fettsnåla måltider, eftersom för mycket fett kan leda till kostrelaterade behandlingseffekter som diarré och gasbesvär.
- ta en multivitamintablett vid sänggåendet
- öka den fysiska aktiviteten.

Orlistat Sandoz får inte säljas till personer:

- som är under 18 år
- med ett BMI under 28 kg/m^2
- som är gravida eller ammar
- som använder ciklosporin
- som använder warfarin eller något annat blodförtunnande läkemedel
- som är allergiska (överkänsliga) mot orlistat eller något annat innehållsämne i läkemedlet

- som har en leversjukdom som kallas kolestas (ett tillstånd där gallflödet från levern hindras)
- som har problem med upptaget av föda (kroniskt malabsorptionssyndrom).

Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder:

Innan du rekommenderar Orlistat Sandoz till en kund **ska du råda kunden att kontakta läkare om hen:**

- använder amiodaron mot hjärtrytmrubbningar
- använder diabetesläkemedel
- använder antiepileptika
- har en njursjukdom
- använder ett sköldkörtelläkemedel (levotyroxin)
- använder hiv-läkemedel
- använder läkemedel mot depression, psykiska störningar eller ångest.

Påminn kvinnor som använder p-piller om att:

- använda ett extra preventivmedel om de får svår diarré.

Påminn också kunderna om att:

- läsa bipacksedeln innan de använder Orlistat Sandoz
- Orlistat Sandoz inte får tas oftare än tre gånger per dag (en kapsel i samband med måltid)
- Orlistat Sandoz inte får användas längre än sex månader.