

Femke 30 mg

kalvopäällysteinen tabletti
ulipristaaliasetaatti

Femke jälkiehkäisyvalmiste

**Femke on lisäinformaatiota vaativa itsehoitolääke.
Se soveltuu hedelmällisessä iässä oleville
naisille, mukaan lukien nuoret.**

Annostus: Yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian, mutta viimeistään 5 vuorokauden (120 tunnin) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen. Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisen jälkeen, on otettava toinen tabletti mahdollisimman pian.

Kehota ottamaan Femke mahdollisimman pian. Femke estää tai viivästyttää ovulaatiota. Ovulaation ajankohtaa kuukautiskierrossa ei voi tarkkaan ennustaa, ja siksi jälkiehkäisytabletti on aina otettava mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen painosta tai painoindexistä riippumatta.

Yleiset haittavaikutukset: Mielialahäiriöt, päänsärky, heitehuimaus, pahoinvointi, vatsakipu, epämukava olo vatsassa, oksentelu, lihaskipu, selkäkipu, dysmenorrea, lantiokipu, rintojen arkuus, väsymys.

AMMATTILAISEN TASKUKORTTI

Jotta jälkielehköisy onnistuisi, käy asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:

1. Femke-valmistetta ei suositella:

- Vaukeaa maksan vaujaatoimintaa sairastaville
- Naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla
- Tiettyjen epilepsia-, HIV- ja tuberkuloosilääkkeiden kanssa
- Mäkiikuusmaa sisältävien valmisteen kanssa
- Vasta-aiheet: yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille

2. Pyydä asiakasta lukemaan pakkausluse.

3. Kerro, että Femke-tabletti on otettava heti.

4. Imetystä ei suositella viikkoon Femke-valmisteen käytön jälkeen.

5. Kuukautiset tai mahdollinen raskaus:

- Femke-tabletin ottamisen jälkeen kuukautiset voivat alkaa aiemmin

tai myöhemmin

- Jos kuukautiset ovat yli 7 vrk myöhässä, on tehtävä raskautesti
- Raskautesti on tehtävä myös, jos kuukautiset ovat epätavallisen niukat, runsaat tai jos esiintyy raskausoireita
- Femke-valmistetta käyttäneiden naisten raskaudet pyydetään ilmoittamaan rekisteriin:
www.ulipristal-pregnancyregistry.com, jossa potilastiedot säilytetään nimettöminä
- Femke ei keskeytä jo alkanutta raskautta

6. Luotettava ehkäisy menetelmää pitää käyttää seuraavien yhdyntöjen aikana, seuraaviin kuukautisiin saakka.

7. Kehota asiakasta kääntymään lääkärin puoleen keskustelemaan hänelle sopivasta, säännöllisestä ehkäisy menetelmästä.

Femke 30 mg kalvopäällysteinen tabletti. Vaikuttava aine: Ulipristaalisetaatti. **Käyttöaihe:** Jälkiehköisy. 120 tunnin (viiden päivän) kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä tai ehkäisy menetelmän petettyä. **Annos-
tus ja antotapa:** Yksi tabletti otetaan suun kautta. Tabletti voidaan ottaa missä tahansa vaiheessa kuukau-
tiskiertoa. Jos kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta ilmenee oksentelua, on otettava toinen tabletti.
Jos kuukautiset ovat myöhässä tai jos ilmenee raskauden oireita, raskauden mahdollisuus tulee poissulkea
ennen kuin tabletti otetaan. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys valmisteen sisältämille aineille. **Varoitukset ja käyt-
töön liittyvät varoitukset:** Vain satunnaisesti käyttöön. Jos seuraavat kuukautiset ovat yli seitsemän päivää
myöhässä, jos kuukautiset ovat luonteeltaan epänormaali tai jos ilmenee raskauden oireita tai tilanne on
muutoin epäselvä, tulee tehdä raskautesti. Naisia on neuvottava käyttämään säännöllistä ehkäisy menetel-
mää. Ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti levonorgestreeliä sisältävän jälkiehköisy valmisteen kanssa tai
naisille, joilla on vaikea maksan vaujaatoiminta tai suun kautta otettavalla glukokortikoidilla hoidettava vaikea
astma. Valmiste sisältää laktoosia. **Yhteisvaikutukset:** Femken teho saattaa heikentyä, jos ritonaviiriä tai
CYP3A4-induktoreita käytetään samanaikaisesti tai jos näitä valmisteita on käytetty edeltävien 4 viikon aikana.
Femke saattaa heikentää progestiinia sisältävien lääkevalmisteen vaikutusta. **Raskaus ja imetys:** Ei pidä
käyttää raskauden aikana. Imetystä ei suositella viikkoon Femken käytön jälkeen. **Vaikutus ajokykyyn ja
koneidenkäyttökykyyn:** Ulipristaalisetaatilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai koneiden-
käyttökykyyn. **Haittavaikutukset:** Yleiset: Mielialahäiriöt, päänsärky, heitehuimaus, pahoinvointi, vatsakipu,
epämukava olo vatsassa, oksentelu, lihaskipu, selkäkipu, dysmenorrea, lantio-
kipu, rintojen arkuus, väsymys. Muut haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto.
(14.01.2025). **Pakkauskoko ja hinta (1.1.2026):** 1 tabl. 22,60 €. Lisäneuvon-
taa vaativa itsehoitolääke. Ei korvattavuutta. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen
lääkkeen toimittamista. **Lisätietoja:** Exeltis Sverige AB, www.exeltis.fi



Exeltis
Rethinking healthcare