

Femke 30 mg

filmdragerad tablett
ulipristalacetat

Femke akut preventivmedel

Femke är ett receptfritt läkemedel som kräver extra rådgivning. Femke kan användas av kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar.

Dosering: En tablett via munnen så snart som möjligt, men senast inom 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning. Om kvinnan kräks inom tre timmar efter att ha tagit tabletten, ska hon så snart som möjligt ta en ny tablett.

Uppmana kvinnan att ta Femke så snart som möjligt

Femke förhindrar eller skjuter upp ägglossning. Det går inte att förutsäga den exakta tidpunkten för ägglossning under en menstruationscykel, därför bör akut p-piller alltid tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag oberoende av kvinnans kroppsvikt eller BMI.

Vanliga biverkningar: Humörstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärta, obehag i buken, kräkningar, myalgi, ryggsmärta, dysmenorré, bäckensmärta, ömhet i bröstet, trötthet.

FICKKORT FÖR VÅRDPERSONAL

Gå igenom följande med kunden för att säkerställa lyckad behandling med akut preventivmedel:

1. Användning av Femke rekommenderas inte:
 - Hos kvinnor med svårt nedsatt leverfunktion
 - Hos kvinnor med svår astma behandlade med orala glukokortikoider
 - Tillsammans med vissa läkemedel mot epilepsi, HIV och tuberkulos
 - Tillsammans med preparat som innehåller johannesört
 - Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
2. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln.
3. Berätta att Femke-tabletten ska tas omedelbart.
4. Efter intag av Femke rekommenderas att man avstår från amning under en vecka.
5. Menstruation eller eventuell graviditet:
 - Efter intag av Femke kan menstruationen komma tidigare eller senare än förväntat
 - Om nästa menstruation är mer än 7 dagar försenad ska ett graviditetstest utföras
 - Ett graviditetstest ska även utföras om menstruationen är ovanligt riklig eller sparsam eller vid graviditetssymtom
 - Man ombeds att rapportera alla graviditeter hos kvinnor som tagit Femke till ett register:
www.ulipristalpregnancyregistry.com, där alla insamlade patientdata kommer att förbli anonyma
 - Femke avbryter inte en pågående graviditet
6. En tillförlitlig preventivmetod ska användas vid följande samlag fram till nästa menstruation.
7. Uppmana kunden att kontakta läkare för att diskutera en lämplig, regelbunden preventivmetod.

Femke 30 mg filmdragerad tablett. Aktiv substans: Ulipristalacetat. **Terapeutisk indikation:** Akutpreventivmedel för användning inom 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning. **Dosering och administreringssätt:** En tablett ska tas via munnen. Vid kräkning inom tre timmar efter intaget av tabletten bör en ny tablett tas. Om en kvinnas menstruation är försenad, eller om det finns symtom på graviditet, skall graviditet uteslutas innan tabletten tas. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot ulipristal eller mot något hjälpämne. **Varningar och försiktighet:** Endast för tillfälligt bruk. Om nästa menstruation är mer än 7 dagar försenad, om menstruationen är onormal, vid graviditetssymtom eller i händelse av osäkerhet ska ett graviditetstest utföras. Samtidig användning med ett akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel rekommenderas inte. Användning hos kvinnor med svårt nedsatt leverfunktion eller svår astma behandlade med orala glukokortikoider rekommenderas inte. Kvinnor ska alltid rekommenderas att börja använda en regelbunden antikonceptionsmetod. Detta läkemedel innehåller laktos. **Interaktioner:** Effekten av Femke kan minska vid samtidig användning med ritonavir eller CYP3A4-inducerare eller om dessa preparat har använts under de senaste 4 veckorna. Femke kan minska effekten av läkemedel som innehåller progestin. **Graviditet och amning:** Ska inte användas under graviditet. Efter intag av Femke rekommenderas att man avstår från amning under en vecka. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Ulipristalacetat kan ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. **Biverkningar:** Vanliga: Humörstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärta, obehag i buken, kräkningar, myalgi, ryggsmärta, dysmenorré, bäckensmärta, ömhet i bröstet, trötthet. Övriga biverkningar, se produktresmén. (14.01.2025). **Förpackningsstorlek och pris (1.1.2026):** 1 tabl. 22,60 €. Egevärdsläkemedel som kräver tilläggsinformation. Icke-ersättningsgillt läkemedel. Läs produktresmén före förskrivning. **Ytterligare information:** Exeltis Sverige AB, www.exeltis.fi



Exeltis
Rethinking healthcare