



Instruktioner för expediering

Sumatriptan Teva 50 mg, 2 tabletter

Innan du expedierar Sumatriptan Teva bör du försäkra dig om att preparatet lämpar sig för patienten. Sumatriptan Teva är avsett enbart för patienter vid behandling av migrän, som tidigare diagnosticerats av läkare och som ordinerats sumatriptan. Kontrollera den ordinerade medicineringen för patienten från Receptcentret (med patientens samtycke).

1. Försäkra att

- A. patientens symtom tyder på migrän **OCH**
- B. att patienten tidigare använt sumatriptan för sin migrän **OCH**
- C. att patientens senaste sumatriptanrecept gått ut högst 6 månader tidigare.

2. Uppmana patienten att uppsöka läkare om

- A. Migränsymtomen har förändrats: anfällen kommer betydligt oftare än förut eller symtomen har förvärrats sedan senaste besök hos läkare.
- B. Patienten i samband med sina migränanfall upplever följande symtom: svaghet i ena kroppshalvan, klumpighet och svårigheter att koordinera sina rörelser, öronsus (tinnitus), nedsatt medvetandegrad eller kramper.

C. Patienten använder MAO-hämmare (t.ex. moklobemid, selegilin, rasagilin).

D. Patienten använder antidepressiva läkemedel (SSRI, SNRI) som ordinerats efter patientens senaste läkarbesök p.g.a. migränen.

E. Patienten använder läkemedel för behandling av hjärt- eller blodtryckssjukdom (t.ex. ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, betablockerare, lipid-modifierande läkemedel, nitrater).

F. Patienten är yngre än 18 år, äldre än 65 år, eller gravid.

Patienten kan expedieras endast en Sumatriptan Teva 50 mg-förpackning med 2 tabletter per gång. Om patientens recept gått ut, ska patienten påminnas om att boka tid hos läkare för uppföljning av migränsituationen och förnyande av receptet.

I oklara fall ska patienten alltid instrueras att uppsöka läkare.

Dosering av Sumatriptan Teva:

Dosering för vuxna i åldern 18-65 år: 1 tablett (50 mg) för behandling av migränattack. Tabletten bör sväljas hel med vatten. Om patienten har svårt att svälja tabletten, kan den delas itu och tas i två delar. Om migränsymptomen lindras efter den första dosen men sedan återkommer, kan patienten ta ytterligare en tablett, förutsatt att det har gått minst två timmar sedan den första tabletten tagits. Högst 2 tabletter får tas inom en period på 24 timmar. Om migränsymtomen inte lindras efter den första tabletten, ska patienten inte ta fler doser under samma migränanfall. Sumatriptan Teva kan användas på nytt vid nästkommande attack.

Om huvudvärken varar i mer än 72 timmar eller om symtomen förändras eller förvärras i förhållande till tidigare migränattacker, ska patienten instrueras att omedelbart kontakta läkare.