

Gör så här om du upplever en allvarlig allergisk reaktion:

- Sluta injicera pegvalias
- Ta adrenalin vid behov (innan du inleder pegvaliasbehandlingen förskriver din läkare en adrenalinspruta och utbildar både dig och observatören i hur och när adrenalin ska användas). Medför alltid adrenalinsprutan
- Ring efter akut vård eller ta dig till närmaste akutmottagning

FÖR SJUKVÅRDPERSONAL

Pegvalias har förskrivits till denna patient. Allvarliga allergiska reaktioner har kopplats till användningen av produkten.

Mer information om pegvalias finns i produktresumén.

Rapportera alla misstänkta biverkningar till drugsafety@bmrn.com eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea, Webbplats: www.fimea.fi.

© 2021 BioMarin International Ltd. Med ensamrätt.
EU-PAL-00004 Januari 2021

BOMARIN[®]

Patientkort för PALYNZIQ[▼] (pegvalias)

▼ Detta läkemedel är föremål för ökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att direkt rapportera alla biverkningar du eventuellt får till BioMarin via drugsafety@bmrn.com; fax: +1-415-532-3144 eller tel: +1-415-506-6179. Biverkningar kan också rapporteras via Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea, Webbplats: www.fimea.fi.

Patientens namn: _____

Ålder: _____

Information om allergier: _____

Andra hälsoproblem (såsom astma): _____

Kontaktinformation vid en nödsituation:

Namn på nära anhörig: _____

Kontaktuppgifter till nära anhörig: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens kontaktuppgifter: _____

Läkarens kontaktuppgifter utanför kontorstid: _____

Pegvalias kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som kan bli livshotande och de kan inträffa när som helst efter en pegvaliasinjektion.

VIKTIGT: Medför alltid en adrenalinspruta och det här kortet. Visa kortet för vårdpersonalen i en nödsituation.

Sluta injicera pegvalias om något av följande symtom uppstår:

Symptom på allvarliga allergiska reaktioner kan omfatta:

- Svullnad av ansikte, ögon, läppar, mun, hals, tunga, händer och/eller fötter
- Andningsproblem eller väsande andning
- Svullnad i halsen, kvävningssänsla
- Problem att svälja eller tala
- Yrsel eller svimning
- Förlorad kontroll över urin eller avföring
- Hög puls
- Urtikaria (kliande och knottriga hudutslag) som snabbt sprider sig
- Hudrodnad
- Kraftiga magkramper eller smärta, kräkning eller diarré