



2

Verkkoiden avulla lääkäri tarkistaa **ennen hoidon aloittamista**, että maksasi toimi kunnolla. Lääkäri näkee tuloksista **maksasi toiminnan** ja sopii ko veren maksaentsyymipitoisuus voi suurentua **Agomelatine Mylan -hoidon aikana**. Näiden maksaentsyymien pitoisuus osoittaa, toimii maksan normaalisti, joten ne ovat lääkäriä tärkeä hoitos seurannan kannalta.

Miksi?

- Käy säännöllisesti verikokeissa

Miten voit välttää maksan toimintahäiriöt hoidon aikana

- Jos tiedät, että sinulla on maksan toimintahäiriöt, kerro siitä lääkäriille. Älä tällöin ota Agomelatine Mylan -tabletteja.
- Voi olla muitakin syitä, miksi Agomelatine Mylan -tabletit eivät ehkä sovi sinulle.
- Kysy lääkäritä neuvoa seuraavista:
 - Jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriötä
 - Jos olet liikalihava tai ylipainoinen
 - Jos sairastat diabetesta
 - Jos käytät alkoholia
 - Jos käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään vaikuttavan maksaan)

Toimennpiteä ennen Agomelatine Mylan -tablettien ottamista

3

Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Agomelatine Mylan -hoidon.

- ihon tai silmien keltaisuus
- tummaa virtsaa
- vaaleita ulosteita
- ylävatsan oikean puolen kipua
- epätavallista väsymystä (etenkin jos siihen liittyy edellä mainittuja oireita)

Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä toimi normaalisti:

- Tarkkaille maksan toimintahäiriöiden merkkejä

Kerro lääkäriille heti, jos saat tietosi, että veresi maksaentsyymipitoisuus suurenee hoidon aikana.

Muista ottaa tämä potilaskortti mukaasi lääkäriin vastaanotolle.

Jos lääkäri suurentaa annoksen 50 mg:aan, kokeet on otettava uudelleen.

Ennen aloitusta tai 3 viikon kuluttua	Noin 6 viikon kuluttua	Noin 3 kuukauden kuluttua	Noin 6 kuukauden kuluttua	Vertikokeet
annosta su-	annosta su-	annosta su-	annosta su-	annosta su-
remittäessä	remittäessä	remittäessä	remittäessä	remittäessä
↑	↑	↑	↑	↑

Millioin?

AJANVARAUKSET VERIKOKEISIIN

MUISTA

Agomelatine Mylan -hoidon aikana on tärkeää käydä säännöllisesti verikokeissa.

Seuraava taulukko auttaa sinua verikokeiden ajanvarauksien seuraamisessa.

	Päivämäärä
Agomelatine Mylan 25 mg -hoidon aloitus	
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi	
1. verikoe (hoidon aloitus)	
2. verikoe (noin 3 viikon kuluttua)	
3. verikoe (noin 6 viikon kuluttua)	
4. verikoe (noin 3 kuukauden kuluttua)	
5. verikoe (noin 6 kuukauden kuluttua)	

	Päivämäärä
Annoksen suurentaminen 50 mg:aan	
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi	
Verikoe aloitettaessa 50 mg:n annoksen käyttö	
2. verikoe (noin 3 viikon kuluttua)	
3. verikoe (noin 6 viikon kuluttua)	
4. verikoe (noin 3 kuukauden kuluttua)	
5. verikoe (noin 6 kuukauden kuluttua)	

Lääkäri päättää, onko tämän jälkeen tarpeen ottaa verikokeita. **Muista ottaa tämä potilaskortti mukaasi lääkäriin vastaanotolle.**

Laatija: Mylan

4



Potilaskortti

Agomelatine Mylan

Agomelatine Mylan (agomelatiini) on masennuslääke, jota voidaan käyttää masennuksen hoitoon.

Jotta saat lääkkeestä parhaan hyödyn, ota agomelatiinia lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti (annostus, hoidon kesto, seurantakäynnit, verikokeet).

Suositukset maksaan kohdistuvien haittavaikutusten välttämiseksi

Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka muuttavat maksan toimintaa.

Tässä oppaassa kerrotaan:

- miten maksaan kohdistuvat haittavaikutukset vältetään
- miten on toimittava, jos agomelatiinihoidon aikana ilmenee maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Kysy lisätietoja lääkäritä.

Lisätietoja saat Agomelatine Mylan -pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

Versio: 1

1

Marraskuu 2018

Fimean hyväksymispäivä 4.12.2018