

Maksan toiminnan seuranta-aikataulu Agomelatine Mylan -hoidossa

Hyväksytty käyttöaihe: aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoito

25 mg

Ennen 25 mg:n annoksen käytön aloittamista

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

3. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

6. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

12. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

24. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

Ota kokeet aina, kun se on kliinisesti aiheellista.

Jos annos suurennetaan **50 mg:aan**, aloita seurantaohjelma uudelleen alusta.

50 mg:n annoksen käyttöön siirtyminen

ALAT.....U/l

ASATU/l

3. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

6. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

12. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

24. viikko

ALAT.....U/l

ASAT.....U/l

Ota kokeet aina, kun se on kliinisesti aiheellista.

Potilaan nimi: _____

Aloituspäivämäärä: _____

Mahdollisen maksavaurion oireet ja löydökset*

Seerumin transaminaasit (ALAT, ASAT)

ALAT ja/tai ASAT
> 3 kertaa ULN**

Suurentunut
ALAT ja/tai ASAT
≤ 3 kertaa ULN**

Normaali

Mahdollisen maksavaurion oireet ja löydökset*

Ei maksavaurion oireita tai löydöksiä

Toista maksan toimintakokeet 48 tunnin kuluessa

ALAT ja/tai ASAT
> 3 kertaa ULN**

ALAT ja/tai ASAT
≤ 3 kertaa ULN**

~~- **Lopeta hoito**~~

- Maksan toimintakokeita (mukaan lukien transaminaasit) jatkettava.

~~- **Lopeta hoito**~~

- Toista maksan toimintakokeita säännöllisesti, kunnes seerumin transaminaasipitoisuus palautuu normaaliksi.

Jatka hoitoa _____

- Noudata maksan seurantakoeaikataulua.

* Esim. tummaa virtsaa, vaaleita ulosteita, ihon tai silmien keltaisuutta, ylävatsan oikean neljänneksen kipua, pitkäkestoista, uudentyyppistä ja selittämätöntä väsymystä

** ULN = normaaliarvojen ylärajaan nähden