

Kaavio Agomelatine ratiopharm -hoidon aikaiseen maksan toiminnan seuraamiseen

Valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe: Vakavien masennustilojen hoito aikuisilla

Agomelatiini 25 mg

Ennen hoidon aloittamista	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
3 viikon kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
6 viikon kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
3 kuukauden kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
6 kuukauden kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L

Tee testi lisäksi aina, kun se on kliinisesti perusteltua

Jos annosta nostetaan 50 mg:aan, aloita seuraaminen alusta

Aloitettaessa 50 mg:lla	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
3 viikon kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
6 viikon kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
3 kuukauden kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L
6 kuukauden kuluttua	ALAT _____ U/L
	ASAT _____ U/L

Tee testi lisäksi aina, kun se on kliinisesti perusteltua

Potilaan nimi:

Aloituspvm:

FI/GEN/18/0154/10/2018

Maksavaurion mahdollisia oireita tai löydöksiä*

Seerumin transaminaasit (ALAT, ASAT)

ALAT ja/tai ASAT
>3 kertaa normaalien viite-
arvojen ylärajaan nähden

Suurentunut ALAT ja/tai ASAT
≤ 3 kertaa normaalien viite-
arvojen ylärajaan nähden

Normaali

Maksavaurion mahdollisia
oireita tai löydöksiä*

Ei maksavaurion mahdollisia oireita tai löydöksiä
Toista maksan toimintakokeet 48 tunnin kuluttuessa

ALAT ja/tai ASAT
>3 kertaa normaalien viite-
arvojen ylärajaan nähden

ALAT ja/tai ASAT
≤ 3 kertaa normaalien viite-
arvojen ylärajaan nähden

- **Lopeta hoito heti**
- Tee maksan toimintakokeet
(sisältäen transaminaasit)

- **Lopeta hoito heti**
- Toista maksan toimintakokeet säännöllisesti kunnes
seerumin transaminaasit palautuvat normaaleiksi

- **Jatka hoitoa**
- Seuraa maksan toimintakokeiden
aikataulua

*) Kuten tumma virtsa, vaaleat ulosteet, ihon tai silmien keltaisuus, ylävatsan oikean puolen kipu, pitkäkestoinen, uudentyypinen ja selittämätön väsymys.

ratiopharm

TEVA

Group Member