



**PIDÄ TÄMÄ KORTTI AINA MUKANASI
NÄYTÄ SE KAIKILLE HOITOOSSI OSALISTUVILLE
TERVEYDENHUOLLON AMMATILAISILLE JA
MENNESSÄSI SAIRAALAAAN**



Luottamuksellisuus ja tietosuojakäytäntö
Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään Sobiin tietosuojakäytännön mukaisesti niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on annettu. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Sobi suojaa henkilötiedot, voit lukea tietosuojakäytäntöme: <https://www.sobi.com/en/politics>. Jos et hyväksy tietojesi käyttämistä näihin tarkoituksiin, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä verkkosivulla olevien yhteystietojen kautta.

TIETOA HOITAVALLE LÄÄKÄRILLE

Tälle potilaalle on määrätty ASPAVELI®-valmistetta (pegsetakoplaani), joka voi lisätä potilaan riskiä sairastua bakteerien, kuten *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* ja *Haemophilus influenzae* tyyppi B, aiheuttamiin vakaviin infektioihin.

- Vakavat bakteeri-infektiot voivat kehittyä nopeasti hengenvaarallisiksi tai johtaa kuolemaan, ellei niitä tunnisteta ja hoideta ajoissa.
- Seuraa potilasta tarkoin vakavien infektioiden varhaisten merkkien ja oireiden varalta, ja tutki potilas välittömästi, jos epäilet infektiota. Hoida tunnetut infektiot viipymättä.
- Jos epäilet vakavaa infektiota, ota mahdollisimman pian yhteyttä hoidon määränneeseen lääkäriin.

Katso lisätietoja ASPAVELI®-valmisteesta valmisteyhteenvedosta.

Ilmoita haittavaikutuksista tai valmisteen turvallisuutta koskevista huolenaiheista. Terveystieteen ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista: www.fimea.fi.

ASPAVELI®-hoitoa saavien potilaiden on pidettävä tämä kortti aina mukanaan. Potilaiden on näytettävä valvottuun jakelujärjestelmään liittyvä viitenumero apteekissa, jotta ASPAVELI®-valmiste voidaan toimittaa.

ASPAVELI® voi suurentaa vakavien ja hengenvaarallisten infektioiden riskiä. Vakavat infektiot voivat kehittyä nopeasti hengenvaarallisiksi ja johtaa kuolemaan, ellei niitä tunnisteta ja hoideta ajoissa. Soita välittömästi lääkärille tai hakeudu ensiapuun, jos havaitset mitä tahansa seuraavista vakavan infektion merkeistä ja oireista:

- päänsärky ja kuume
- kuume ja ihottuma
- kuume, johon saattaa liittyä vilunväreitä
- hengenahdistus
- korkea syke
- nihkeä iho

- päänsärky, johon liittyy niskan tai selän jäykkyyttä
- päänsärky, johon liittyy pahoinvointia tai oksentelua
- silmien valoherkkyys
- lihaskivut ja flunssan kaltaiset oireet
- sekavuus
- erittäin voimakkaat kivut ja epämukavat tuntemukset

Pidä tämä kortti aina mukanasi hoidon aikana ja 2 kuukautta viimeisen annoksen jälkeen. Sinulla voi olla vakavien infektioiden riski vielä useita viikkoja viimeisen annoksen jälkeen.

Näytä tämä kortti kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat hoitoosi.

Potilaan nimi

Valvottuun jakelujärjestelmään liittyvä viitenumero

Lääkkeen määränneen lääkärin nimi

Lääkkeen määränneen lääkärin puhelinnumero