

## Potilaan seurantalomake Atomoxetine STADA -valmisteele. Täytetään ennen hoidon alkua.

Potilaan tiedot \_\_\_\_\_ Pvm \_\_\_\_\_

ADHD:n hoitoon perehtynyt lääkäri on tehnyt ADHD-diagnoosin DSM-kriteerein tai ICD-ohjeiden mukaan.

Potilaan sairaushistoria on selvitetty, mukaan lukien:

- Samanaikainen lääkitys: \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

*Huom. Atomoksetiin ja verenpainelääkkeiden tai verenpainetta nostavien lääkkeiden (kuten salbutamolin) samanaikaisessa käytössä tulee noudattaa varovaisuutta mahdollisten verenpainevaikutusten takia.*

- Sairaudet suvussa: \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

*Huom. Suvussa ilmennyt äkillinen sydämeistä johtuva tai selittämätön kuolema tai maligni arytmia ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.*

- Aikaisemmat ja nykyiset muut sairaudet tai oireet: \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
-

Fyysinen tarkastus tehty

Muistiinpanot: \_\_\_\_\_

Potilaalle on tehty kardiiovaskulaarisen tilan arviointi lähtötilanteessa, mukaan lukien verenpaine ja sydämen syke. *(Suositellaan että lapsilla nämä arvot kirjataan viitearvokäyrästölle. Jos tällaista ei ole saatavilla, ohessa olevaa lomaketta voidaan käyttää.)*

Arviointi osoittaa, ettei potilaalla ole vakavaa kardiiovaskulaarista tai aivoverenkierron häiriötä.  
- *Joitakin esimerkkejä potilaista, joiden olemassa oleva kardiiovaskulaarinen tila tai aivoverenkierron häiriö voisi kriittisesti huonontua: vaikea verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, ahtauttava valtimosairaus, rasitusrintakipu, hemodynaamisesti merkittävä synnynnäinen sydänvika, kardiomyopatia, sydäninfarkti, mahdollisesti henkeä uhkaavat sydämen rytmihäiriöt ja ionikanavien toimintahäiriöstä johtuvat sairaudet, aneurysma aivoissa ja aivoinfarkti.*

*Merkitse yksi vaihtoehto:*

Potilaan anamneesi ja fyysinen tila eivät viittaa kardiiovaskulaari- tai aivoverisuonten sairauteen.

**TAI**

Potilaan anamneesi ja fyysinen tila viittaavat kardiiovaskulaari- tai aivoverenkierron sairauteen ja kardiologi on todennut, että Atomoxetine STADA -lääkitys voidaan aloittaa huolellisen seurannan myötä.

**Kaikki laatikot tulee täyttää ennen kuin lääkitys voidaan aloittaa potilaalle.**

---

## Kardiovaskulaarivaikutusten seurantalomake Atomoxetine STADA -lääkityksen aikana

Potilaan tiedot \_\_\_\_\_ Pvm \_\_\_\_\_

- Verenpaine ja sydämen syke on mitattu jokaisen annosmuutoksen yhteydessä tai vähintään kuuden kuukauden välein.  
(Lapsilla mittaukseen suositellaan käytettäväksi viitearvokäyrästä. Jos sitä ei ole käytettävissä, voidaan käyttää oheista taulukkoa.)

Muistiinpanot: \_\_\_\_\_

*Merkitse yksi vaihtoehto:*

- Potilaalle EI ole kehittynyt merkkejä tai oireita uudesta kardiovaskulaarisairaudesta tai aiemmin todetun kardiovaskulaarisairauden pahenemisesta.

**TAI**

- Potilaalle on kehittynyt merkkejä/oireita uudesta kardiovaskulaarisairaudesta tai aiemmin todettu tila on pahentunut ja kardiologin perusteellisen tutkimuksen perusteella Atomoxetine STADA -lääkitystä voidaan jatkaa.

Muistiinpanot: \_\_\_\_\_

*Merkitse yksi vaihtoehto:*

- Potilaalle EI ole kehittynyt uusia neurologisia merkkejä tai oireita.

**TAI**

- Potilaalla on ilmennyt uusia neurologisia merkkejä tai oireita ja alan erikoislääkärin mukaan Atomoxetine STADA -lääkitystä voidaan jatkaa.

Muistiinpanot: \_\_\_\_\_

*Merkitse yksi vaihtoehto:*

- Potilas on saanut atomoksetiinilääkitystä alle vuoden.

**TAI**

- Potilas on saanut atomoksetiinilääkitystä yli vuoden ja arviointi hoidon tarpeesta on tehty ADHD:n hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta.

Muistiinpanot: \_\_\_\_\_

**Jokainen laatikko tulee täyttää jokaisen käynnin yhteydessä.**

