

MITÄ BAQSIMI® ON

Baqsimi® on nenään annosteltava glukagonijauhe.

- **Baqsimi®-valmistetta käytetään vaikean hypoglykemian (erittäin matalan verensokerin) hoitoon**, kun potilas ei pysty syömään tai juomaan itse ja tarvitsee toisen apua.
- On tärkeää, että potilaan ympärillä olevat ihmiset tunnistavat hypoglykemian mahdolliset oireet, jotta he voivat tarvittaessa auttaa häntä.

Mahdollisia hypoglykemian oireita voivat olla:

- huimaus
- keskittymisvaikeus tai sekavuus
- kouristukset tai tajunnan menetys
- mielialan vaihtelut
- koordinaatiokyvyn heikentyminen
- vapina tai hikoilu



Lääketurvatietao

Diabetespotilaiden, joille on määrätty Baqsimi®-valmiste, tulee:

- pitää valmiste aina saatavilla
- näyttää muille, miten käyttää valmistetta
- kertoa muille, missä he pitävät Baqsimi®-valmistettaan

Voit katsoa Baqsimi®-valmisteen käyttöohjevideon osoitteessa www.baqsimi.eu.

FIMEAn hyväksymä 14.1.2026

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny
sur Eppe, Ranska
Puhelinvaihe: +358 75 3257709
Tiedustelut: gps@amphastar.com
© 2024 Amphastar France Pharmaceuticals.
All rights reserved.
Amphastar and Baqsimi® are registered
trademarks of Amphastar France Pharmaceuticals.
01-524-01-FI 08-2025

baqsimi®

TIETOA HARJOITTELU- LAITTEESTA

Katso tästä esitteestä lisätietoja,
kuinka käyttää Baqsimi®-valmisteen
harjoittelulaitetta.

KÄYTTÖAIHE

Baqsimi® on tarkoitettu vaikean hypoglykemian hoitoon aikuisille, nuorille ja 1 vuosi täyttäneille lapsille, joilla on diabetes mellitus.



HARJOITTELULAITE

- Tämä harjoittelulaite on tarkoitettu Baqsimi®-valmisteen käytön opettamis- ja harjoittelutilanteisiin.
- Huomioithan** seuraavat merkittävät eroavaisuudet harjoittelulaitteen ja lääkkeen oikean annosteluvälineen välillä. Harjoittelulaite:
 - ei sisällä lääkeainetta.
 - on tarkoitettu vain opastukseen. Harjoittelulaitetta ei tule laittaa sieraimeen harjoittelun yhteydessä asianmukaisen hygienian noudattamiseksi.
 - ei tule säilyttää yhdessä Baqsimi®-valmisteen oikean annosteluvälineen kanssa, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta hypoglykemia-tilanteissa.

Annoksen antaminen:

Harjoittelulaitetta ei tule laittaa sieraimeen harjoittelun yhteydessä.



- PITELE** kerta-annospakkausta sormien välissä kuten kuvassa. **Älä paina annospainiketta ennen nenään asettamista.**




- ASETA** kertaannospakkauksen kärki toiseen sieraimeen.



- PAINA** annospainike kokonaan pohjaan, kunnes annospainikkeen vihreä viiva ei enää näy.

Harjoittelulaitteen palauttaminen aloitustilaan:



- PITELE harjoittelulaitteen kärkeä sormien välissä kuten kuvassa. Kierrä harjoittelulaitteen runkoa kunnes painike palautuu aloitustilaan ja painikkeen vihreä viiva on jälleen näkyvässä.

Harjoittelulaitteesta poiketen jokaisen lääkeainetta sisältävän Baqsimi®-kertaannospakkauksen voi käyttää vain kerran.