

VAD ÄR BAQSIMI?

BAQSIMI innehåller glukagon och ges direkt i näsan med en endosbehållare.

När används BAQSIMI?

- BAQSIMI används vid svår hypoglykemi då personen inte klarar av att äta eller dricka och behöver hjälp med att höja blodsockret.
- Det är viktigt att familj och vänner har kunskap om och känner till symtom som kan uppstå vid lågt blodsocker så att de kan hjälpa till.

Exempel på symtom vid svår hypoglykemi:

- Yrsel
- Förvirring
- Kramper eller medvetslöshet
- Humörsvängningar
- Försämrade koordination
- Darrig, skakig, svettningar



BAQSIMI endosbehållare med läkemedel

BAQSIMI®

(glukagon 3 mg näspulver i endosbehållare)

Personer med diabetes som har fått BAQSIMI förskrivet bör:

- alltid ha läkemedlet med sig
- visa familj/vänner hur det används
- informera om vart BAQSIMI förvaras

Notera att denna demonstrationssats endast innehåller en övningsenhet utan aktiv substans.

På baqsimi.eu finns en instruktionsfilm om Baqsimi.

Godkänt av FIMEA den 14.1.2026

© 2025 Amphastar France Pharmaceuticals.
All rights reserved.

Amphastar and Baqsimi® are registered trademarks of Amphastar France Pharmaceuticals.

01-524-01-FI 08-2025



BAQSIMI®

(glukagon 3 mg näspulver i endosbehållare)

INSTRUKTION FÖR ÖVNINGSENHET

I den här foldern finns information om hur du använder BAQSIMI övningsenhet.


Indikation

BAQSIMI är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 1 år ålder med diabetes mellitus.

Läs bipacksedel och bruksanvisning noga. Vid frågor kontakta din läkare.

ÖVNINGSENHET

- Övningsenheten är avsedd för demonstration och utbildning i hur BAQSIMI ska användas.
- Var uppmärksam på följande skillnader mellan övningsenheten och BAQSIMI endosbehållare:
 - **Övningsenheten innehåller inget läkemedel.**
 - **Övningsenheten är endast avsedd för demonstration och övning** och ska av hygieniska skäl inte föras in i näsan.
 - **Övningsenheten ska inte förvaras tillsammans med BAQSIMI** för att undvika förväxling.
 - **Till skillnad mot BAQSIMI kan övningsenheten återanvändas.**



Blå övningsenhet utan läkemedel

HANDHAVANDE

Vid demonstration ska övningsenheten inte föras in i näsan.



- **Håll** endosbehållaren mellan fingrarna. **Tryck inte in kolven eller testa endosbehållaren.**



- **För in spetsen** i ena näsborren tills fingrarna rör vid utsidan av näsan.




- **Tryck in kolven** helt med tummen, **tills den gröna linjen på kolven inte syns längre.**

Efter dosering: Om personen med lågt blodsocker är medvetslös ska personen vändas på sidan. **Ring alltid och omedelbart 112 för medicinsk hjälp.**

ÅTERSTÄLLA ÖVNINGSENHETEN

Till skillnad mot BAQSIMI endosbehållare kan övningsenheten återanvändas.



Håll i den nedre delen av spetsen. Vrid behållaren tills kolven kommer fram och den gröna linjen blir synlig igen.

Ytterligare upplysningar om Baqsimi kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Amphastar France Pharmaceuticals , Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte, Frankrike +46 10 102 04 47, www.baqsimi.eu