

Muista tämä:

- Blincyto voi aiheuttaa neurologisia tapahtumia, kuten
 - » vapinaa
 - » vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta (afasiaa)
 - » sekavuuden tunnetta
 - » aivotointojen häiriöitä
 - » kouristuskohtauksia. (enkefalopatiaa)



Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista.



Matkusta turvallisesti kotiin, äläkä aja autoa tai käytä kulkuvälineitä / raskaita koneita tai ryhdy vaarallisiin toimiin sinä aikana, kun saat Blincyto-hoitoa.

- Jos ilmenee ongelmia tai infuusiopumppu pysähtyy odottamatta, soita heti lääkärille tai sairaanhoitajalle. Älä yritä korjata ongelmia itse.

Versio 3.0 Hyväksytty: heinäkuussa 2021

Potilaskortti



Näytä tätä korttia aina asioidessasi akuutin hoidon tai muiden terveydenhuollon työntekijöiden kanssa

**BLINCYTO® (blinatumomabi)
– tietoa valmisteesta**

Nimi _____

Yhteyshenkilö hätätilanteessa

Sairastan B-solulinjan akuuttia lymfaattista leukemiaa, johon saan Blincyto-hoitoa. Hoito voi heikentää immuunijärjestelmän toimintaa.

Hoito aloitettiin (pvm) _____

Muita lääkityksiä harkittaessa tai aloitettaessa on syytä huomioida potilaan meneillään oleva blinatumomabihoito ja tarvittaessa konsultoitava asiasta hoitavaa yksikköä. Hoitavan lääkärin yhteystiedot ovat alla. Jos tutkimuksia tehdään, toimittakaa kopiot kaikista potilasasiakirjoista, myös mahdollisesti annetuista hoidoista ja/tai tutkimustuloksista alla mainitulle lääkärille.

Nimi

Sairaala

Kaupunki

Puhelinnumero

Hematologi

Hematologinen
sairaanhoitaja

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi).

Versio 3.0 Hyväksytty: heinäkuussa 2021