

Kom ihåg!

- BLINCYTO kan orsaka neurologiska biverkningar som
 - » skakningar (tremor)
 - » förvirring
 - » störningar i hjärnans funktion (encefalopati)
 - » kommunikationssvårigheter (afasi)
 - » krampanfall (konvulsioner).



Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom.



Se till att resa hem på ett säkert sätt och att inte köra eller använda fordon i rörelse/tunga maskiner eller delta i farliga aktiviteter medan du får BLINCYTO.

- Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om det uppstår problem eller infusionspumpen oväntat stannar. Försök inte att lösa några problem själv.

Version 3.0 Godkänd: juli 2021

Patientkort



Visa detta kort vid akutvård och när du träffar annan hälso- och sjukvårdspersonal

**Information om BLINCYTO®
(blinatumomab)**

Namn: _____

I en nödsituation, kontakta:

Jag behandlas med BLINCYTO, ett läkemedel mot pre-B akut lymfatisk leukemi, som kan hämma immunsystemet.

Behandlingen påbörjades
(datum): _____

När man överväger eller påbörjar andra mediciner bör man beakta patientens pågående blinatumomab behandling och vid behov konsultera den behandlande enheten. Den behandlande läkarens kontaktuppgifter finns nedan. Vid eventuella medicinska bedömningar ska kopior på patientjournaler med eventuella behandlingar och/eller provsvar skickas till namngivna läkare nedan.

	Namn	Sjukhus	Stad	Telefonnummer
Hematolog				
Hematologi- sjuksköterska				

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea (webbplats: www.fimea.fi).

Version 3.0 Godkänd: juli 2021