

**KLOZAPIN: Insättning av behandling**

- Insättning av behandling med klozapin måste begränsas till patienter med vita blodkroppar  $\geq 3\,500/\text{mm}^3$  ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal  $\geq 2\,000/\text{mm}^3$  ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ ) inom standardiserade normalvärden.
- Behandling med klozapin tabletter ska påbörjas med 12,5 mg (en halv tablett à 25 mg) en eller två gånger den första dagen, följt av 25 mg en eller två gånger den andra dagen. Om detta tolereras väl kan dagsdosen ökas långsamt i steg om 25 till 50 mg för att uppnå en dosnivå på upp till 300 mg/dag inom 2 till 3 veckor. Därefter kan dagsdosen vid behov ökas ytterligare i steg om 50 till 100 mg två gånger per vecka eller, företrädesvis, en gång per vecka.

**Rekommenderad dositering av Clozapine Accord vid behandlingsstart**

Vecka 1	Morgondos (mg)	Dos vid sänggående (mg)	Totalt (mg)	Vecka 2	Morgondos (mg)	Dos vid sänggående (mg)	Totalt (mg)
Dag 1	12.5	12.5	12,5 - 25	Dag 8	50	100	150
Dag 2	25	—	25	Dag 9	100	100	200
Dag 3	25	25	50	Dag 10	100	100	200
Dag 4	25	50	75	Dag 11	50	200	250
Dag 5	50	50	100	Dag 12	50	200	250
Dag 6	50	75	125	Dag 13	100	200	300
Dag 7	50	100	150	Dag 14	100	200	300

Valfria efterföljande dosökningar ska inte ske mer än en eller två gånger i veckan, i steg som inte överskrider 100 mg.

## Klozapin: Behandling av patienten

- Vid varje besök måste en patient som får klozapin påminnas om att omedelbart kontakta behandlande läkare om någon form av infektion utvecklas
- Var särskilt uppmärksam på influensaliknande besvär som feber eller halsont och andra tecken på infektion, som kan tyda på neutropeni.
- Patienter och deras vårdgivare måste informeras om att blodstatus omedelbart måste kontrolleras vid något av dessa symtom.
- Förskrivare bör föra in patienternas samtliga blodvärden i journalen och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dessa patienter av misstag återinsätts på läkemedlet.

### Myokardit:

- Klozapin är förenat med en ökad risk för myokardit, som i sällsynta fall har varit dödlig. Den ökade risken för myokardit är störst under de första 2 behandlingsmånaderna. Dödliga fall av kardiomyopati har också rapporterats i sällsynta fall.
- Myokardit eller kardiomyopati bör misstänkas hos patienter som får ihållande takykardi i vila, särskilt under de första 2 behandlingsmånaderna och/eller hjärklappning, arytmier, bröstsmärta och andra tecken och symtom på hjärtsvikt (t.ex. oförklarlig trötthet, dyspné, takypné) eller symtom som efterliknar myokardinfarkt.
- Behandling med klozapin ska avbrytas och patienten ska omedelbart remitteras till en kardiolog om myokardit eller kardiomyopati misstänks.
- Klozapin ska inte ges på nytt till patienter som har utvecklat klozapininducerad myokardit eller kardiomyopati.

**Tabell 1. Kontrollfrekvens baserat på behandlingsstadium eller resultat av kontroll av vita blodkroppar och absolut neutrofilantal**

Situation	Hematologiska värden för kontroll	Kontrollfrekvens av vita blodkroppar och absolut neutrofilantal
Insättning av behandling	Normala leukocytresultat – vita blodkroppar $\geq 3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal $\geq 2\,000/\text{mm}^3$ ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ )	Vita blodkroppar och absolut neutrofilantal utförs varje vecka under de första 18 veckorna.
Behandlingslängd mer än 18 veckor	Vita blodkroppar $\geq 3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal $\geq 2\,000/\text{mm}^3$ ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ )	Vita blodkroppar och absolut neutrofilantal utförs med ett intervall på minst 4 veckor.
Under behandling	Antingen faller vita blodkroppar till mellan $3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och $3\,000/\text{mm}^3$ ( $3,0 \times 10^9/\text{l}$ ) eller absolut neutrofilantal till mellan $2\,000/\text{mm}^3$ ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ ) och $1\,500/\text{mm}^3$ ( $1,5 \times 10^9/\text{l}$ )	Hematologiska bedömningar måste utföras minst två gånger per vecka till patientens vita blodkroppar och absolut neutrofilantal stabiliseras inom intervallet $3\,000 - 3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,0 - 3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) respektive $1\,500 - 2\,000/\text{mm}^3$ ( $1,5 - 2,0 \times 10^9/\text{l}$ ) eller högre.
Utsättning av behandling (av andra skäl än hematologiska)		Patienter som har fått klozapin-tabletter i mer än 18 veckor och med ett behandlingsavbrott på mer än 3 dagar men mindre än 4 veckor ska kontrollera vita blodkroppar och absolut neutrofilantal varje vecka i ytterligare 6 veckor. Om inga hematologiska avvikelser uppkommer, kan kontroller vid intervall som inte överstiger 4 veckor återupptas. Om behandling med klozapin-tabletter har avbrutits under 4 veckor eller mer, krävs kontroll varje vecka under de kommande 18 behandlingsveckorna och dosen ska titreras på nytt.

Situation	Hematologiska värden för kontroll	Kontrollfrekvens av vita blodkroppar och absolut neutrofilantal
Utsättning av behandling (av hematologiska skäl)	Vita blodkroppar $< 3\,000/\text{mm}^3$ ( $< 3,0 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal $< 1\,500/\text{mm}^3$ ( $< 1,5 \times 10^9/\text{l}$ )	Blodproven måste tas dagligen tills blodvärdena normaliseras. Patienter hos vilka klozapintabletter har satts ut som en följd av brist på vita blodkroppar eller absolut neutrofilantal ska inte återinsättas på läkemedlet.
Återinsättning av behandling (patienter som har stått på klozapintabletter i mer än 18 veckor och med behandlingsavbrott i $> 3$ dagar men mindre än 4 veckor)	Vita blodkroppar $\geq 3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal $\geq 2\,000/\text{mm}^3$ ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ )	Återinsättning av behandling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vita blodkroppar och absolut neutrofilantal kontrolleras varje vecka i ytterligare 6 veckor.</li> <li>• Om inga hematologiska avvikelser uppkommer, kan kontroll med intervall som inte överstiger 4 veckor återupptas.</li> </ul>
Återinsättning av behandling (hos patienter med behandlingsavbrott på 4 veckor eller längre)	Vita blodkroppar $\geq 3\,500/\text{mm}^3$ ( $3,5 \times 10^9/\text{l}$ ) och absolut neutrofilantal på $\geq 2\,000/\text{mm}^3$ ( $2,0 \times 10^9/\text{l}$ )	Återinsättning av behandling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vita blodkroppar och absolut neutrofilantal kontrolleras varje vecka under de följande 18 veckorna och dosen titreras på nytt.</li> </ul>