

Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

DEHYDROBENZPERIDOLIN® 2,5 MG/ML, INJEKTIONESTE, LIUOS, KÄYTTÖ LEIKKAUKSEN JÄLKEISEN PAHOINVOINNIN JA OKSENTELUN (PONV) EHKÄISYYN JA HOITON

Dehydrobenzperidol

Noudata käyttöaiheita

- Aikuiset: Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV) ehkäisy ja hoito
- Lapset (> 2-vuotiaat) ja nuoret: Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV) ehkäisy ja hoito toisen linjan vaihtoehtona

Noudata annostusta

- Ehkäisy: Annetaan 30 minuuttia ennen anestesian arvioitua päättymisajankohtaa
- Hoito: Kuuden tunnin välein tarpeen mukaan
- Aikuiset: 0,625–1,25 mg
- Iäkkäät potilaat: 0,625 mg
- Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta: 0,625 mg
- Lapset (> 2-vuotiaat) ja nuoret: 10–50 mikrogrammaa/painokg, enintään 1,25 mg
- Kerta-annos enintään: 1,25 mg

Huomioi vasta-aiheet

Älä anna Dehydrobenzperidolia® potilaille

- jotka ovat yliherkkiä droperidolille, jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle tai butyrofenoneille
- joiden QT-ajan tiedetään tai epäillään olevan pidentynyt (QTc > 450 ms naisilla, > 440 ms miehillä)
- joilla on hypokalemia tai hypomagnesemia
- joilla on bradykardia (syke < 55 lyöntiä minuutissa)
- jotka saavat samanaikaisesti hoitoa, jonka tiedetään aiheuttavan bradykardiaa
- joilla on feokromosytooma
- jotka ovat koomassa
- joilla on Parkinsonin tauti
- jotka sairastavat vaikeaa masennusta.

Kiinnitä erityistä huomiota potilaisiin, joilla on seuraavia sydämen rytmihäiriöiden riskitekijöitä

- aikaisempi merkittävä sydänsairaus
- suvussa esiintynyt äkkikuolema
- munuaisten vajaatoiminta
- merkittävä krooninen keuhkohtaumatauti ja hengitysvajaus
- elektrolyyttihäiriöiden riskitekijöitä, esim. diureettien tai laksatiivien pitkäaikaiskäyttö, glukokortikoidien käyttö tai insuliinin anto akuuttitilanteissa, pitkään jatkunut oksentelu tai ripuli.

Näiden potilasryhmien hoidossa

- arvioi elektrolyytti- ja kreatiniinipitoisuus ennen leikkausta
- sulje pois pidentynyt QTc-aika ennen droperidolin antoa
- seuraa tilaa jatkuvalla pulssioksimetrialla 30 minuutin ajan jokaisen droperidoliannoksen jälkeen.

Jos Dehydrobenzperidolia® käytetään yhdessä sytokromi P450 1A2- ja 3A4-isoentsyymien estäjien kanssa, varaudu farmakologisen vaikutuksen pidentymiseen.

* Ehkäisyyn = Postoperatiivinen pahoinvointi ja oksentelu