

ESMYA 5 mg TABLETTER

PATIENTKORT

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU PÅBÖRJAR BEHANDLINGEN

Esmya kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En eventuell biverkning är allvarlig skada på levern.

Det här kortet innehåller information om blodproverna som du behöver ta under behandlingen och om vad du ska göra om du får leverbiverkningar.

Ta inte Esmya om du har leverproblem.

Tala om för din läkare om du vet att du har leverproblem eller om du är osäker på din leverfunktion.

VAD DU SKA GÖRA INNAN, UNDER OCH EFTER BEHANDLINGEN

Ta regelbundna blodprover

Du måste ta blodprover innan du påbörjar varje behandlingskur för att ta reda på hur din lever fungerar. Utifrån resultaten från proverna avgör läkaren om du kan behandlas med Esmya.

Under behandlingen med Esmya utför din läkare regelbundna blodprover för att kontrollera leverfunktionen. Dessa blodprover måste tas varje månad, inklusive några veckor efter att du har avslutat en behandlingskur (se schemat nedan). Blodproverna ger läkaren information om din leverfunktion och är nödvändiga under övervakningen av din behandling.

TABELLEN NEDAN HJÄLPER DIG ATT HA KOLL PÅ BLODPROVERNA:

	DATUM
1:a TESTET (innan behandlingen påbörjas)	
Behandlingen påbörjas	
2:a TESTET (4 veckor efter påbörjad behandling)	
3:e TESTET (8 veckor efter påbörjad behandling)	
4:e TESTET (12 veckor efter påbörjad behandling)	
5:e TESTET (2–4 veckor efter avslutad Esmya-behandling)	

TECKEN OCH SYMTOM PÅ MÖJLIGA LEVERPROBLEM

Avbryt behandlingen och sök genast läkarvård om du observerar något av följande tecken eller symtom:

- utmattning, svår trötthet
- gul hud/gula ögon
- mörk urin
- smärta i övre högra delen av magen
- klåda