

ESMYA 5 mg TABLETIT

POTILASKORTTI

MITÄ SINUN PITÄÄ TIETÄÄ ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ?

Esmya voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Eräs mahdollisista haittavaikutuksista on vakava maksaan kohdistuva vaurio.

Tässä kortissa on tietoa verikokeista, joita sinulta tulee ottaa hoidon aikana ja tietoa siitä, mitä sinun tulee tehdä, jos maksan haittavaikutuksia ilmenee.

Älä ota Esmyaa, jos sinulla on maksaongelmia. Kerro lääkärillesi, jos tiedät, että sinulla on maksaongelmia tai jos sinulla on epäilyksiä maksasi kunnosta.

MITÄ HOITOA ENNEN, SEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN TULEE TEHDÄ?

Käy säännöllisesti verikokeissa

Sinulta pitää ottaa verikokeita ennen kunkin hoitajakson aloittamista, jotta voidaan selvittää, miten maksasi toimii. Näiden kokeiden tulosten perusteella lääkäri päättää, sopiiko Esmya-hoito sinulle.

Esmya-hoidon aikana lääkärisi määrää sinut verikokeisiin säännöllisesti maksasi toiminnan tarkistamiseksi. Nämä kokeet pitää tehdä kerran kuukaudessa, mukaan lukien muutama viikko sen jälkeen, kun hoitajakso on loppunut (katso alla oleva aikataulu). Nämä verikokeet kertovat lääkärille maksasi toiminnasta ja ovat elintärkeitä hoitosi seuraamisessa.

ALLA OLEVAN TAULUKON AVULLA VOIT SEURATA VERIKOKEITASI:

	PÄIVÄMÄÄRÄ
1. KOE (ennen hoidon aloittamista)	
Hoidon aloitus	
2. KOE (4 viikkoa hoidon aloittamisen jälkeen)	
3. KOE (8 viikkoa hoidon aloittamisen jälkeen)	
4. KOE (12 viikkoa hoidon aloittamisen jälkeen)	
5. KOE (2–4 viikkoa Esmya-hoidon lopettamisen jälkeen)	

MAHDOLLISTEN MAKSAONGELMIEN MERKKEJÄ JA OIREITA

Lopeta hoito ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos havaitset jotain seuraavista merkeistä tai oireista:

- uupumus, vaikea väsymys
- ihon tai silmien keltaisuus
- virtsan tumma väri
- kipu oikealla ylävatsalla
- kutina
- pahoinvointi
- oksentelu

Lääkärin tulee tarkistaa maksasi kunto välittömästi ja päättää, voitko jatkaa hoitoa.