

**POTILASKORTTI**

<p>((Back cover))</p> <p><b>RASKAUS, HEDELMÄLLISYYS, IMETYS</b></p> <p>Älä ota Ferriproxia, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät. Ferriprox voi vahingoittaa vauvaasi vakavasti. Jos olet raskaana tai imetät Ferriprox-hoidon aikana, kerro siitä välittömästi lääkärillesi ja kysy neuvoa.</p> <p>Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on suositeltavaa käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää Ferriprox-hoidon aikana ja 6 kuukautta viimeisen annoksen jälkeen. Miesten on suositeltavaa käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja 3 kuukautta viimeisen annoksen jälkeen. Kysy lääkäriltäsi, mikä menetelmä on Sinulle sopivin.</p> <p>4</p>	<p>((Front Cover))</p> <p><b>POTILASKORTTI</b></p> <p><b>Tärkeä turvallisuusmuistutus Ferriproxia (deferiproni) ottaville potilaille</b></p> <p>Lääkkeen määrännyt lääkäri: _____</p> <p>Puh: _____</p> <p>1</p>
<p>((Inside 1))</p> <p><b>VEREN VALKOSOLUMÄÄRÄN TARKKAILEMINEN KÄYTETTÄESSÄ FERRIPROXIA</b></p> <p>On olemassa vähäinen agranulosytoosin kehittymisen mahdollisuus otettaessa Ferriproxia. Tällöin veren valkosolujen määrä laskee erittäin alhaiseksi, jolloin voi aiheutua vakava infektio. Vaikka agranulosytoosia esiintyy vain 1–2 käyttäjällä sadasta, verta on syytä tarkkailla säännöllisesti.</p> <p>2</p>	<p>((Inside 2))</p> <p>Tee seuraavat toimet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sinusta on otettava verinäytteitä viikoittain ensimmäisen Ferriprox-hoitovuoden aikana ja tämän jälkeen lääkärisi suositusten mukaisesti.</li><li>2. Jos saat kuumeen, kurkkukivun tai flunssan kaltaisia infektion oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Valkosolujesi määrä on tarkastettava 24 tunnin kuluessa, jotta mahdollinen agranulosytoosi havaitaan.</li></ol> <p>3</p>