



Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti

Fingolimod Avansor
(fingolimodi)

Versio 2
Fimean hyväksymä 11/2021

Varotoimet ennen Fingolimod Avansor -hoidon aloittamista

Älä ota Fingolimod Avansoria, jos olet raskaana tai olet nainen, joka voi tulla raskaaksi (mukaan lukien teini-ikäiset tytöt), mutta et käytä tehokasta ehkäisyä.

- Ennen kuin aloitat Fingolimod Avansor -hoidon ja säännöllisesti hoidon aikana, lääkärisi kertoo sinulle sikiöön kohdistuvasta riskistä ja pyytää sinua tekemään raskaustestin varmistaakseen, ettet ole raskaana.
- Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vielä 2 kk ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Varotoimet Fingolimod Avansor -hoidon aikana

- Sikiöön kohdistuvien riskien johdosta Fingolimod Avansor -hoidon aikana ei saa tulla raskaaksi.
- Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä Fingolimod Avansor -hoidon aikana.
- Keskustele lääkärisi kanssa luotettavista ehkäisymenetelmistä.
- Et saa tulla raskaaksi vielä 2 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeenkään, jotta lääkeaine on ennätännyt poistua elimistöstäsi.

Jos tulet raskaaksi Fingolimod Avansor -hoidon aikana

- Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos tulet raskaaksi Fingolimod Avansor -hoidon aikana.
- Jos tulet raskaaksi lääkärisi lopettaa Fingolimod Avansor -hoidon ja sinulle tehdään ultraäänitutkimus.
- Kerro heti lääkäriille, jos sinusta vaikuttaa, että MS-tautisi pahenee Fingolimod Avansor -hoidon lopettamisen jälkeen.
- Raskauden aikana toteutetaan erityisseurantaa.

Muistiinpanoja

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
0034 FIMEA
www.fimea.fi

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle:

Avansor Pharma Oy
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
sähköposti: info@avansorpharma.fi
puh: 050-46 66 881
www.avansorpharma.fi



Tekniikantie 14, 02150 Espoo
puh. 050 46 66 881
www.avansorpharma.fi