

# Idacio<sup>®</sup> potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio<sup>®</sup>-hoitoa ja sen aikana.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)).

Idacio<sup>®</sup>

## **Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio®-hoitoa ja sen aikana.**

- Pidä tämä kortti mukanasasi aina ja vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla käyt.
- Merkitse tehdyt tuberkuloositestit ja tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito tämän kortin takasivulle.

### **Johdanto**

IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu immuunijärjestelmän erääseen osaan vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon. Idacio® voi tehot näiden sairauksien hoitoon, mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat olla kullakin henkilöllä erilaisia.

- Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon haittavaikutuksista.
- Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm. infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

### **Ennen Idacio®-hoitoa**

Kerro lääkärille mahdollisista sairauksistasi ja mahdollisesti jo käyttämistäsi lääkkeitä, jotta voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®-hoito sinulle.

#### **Kerro lääkärille**

- jos sinulla on jokin infektio tai infektion oireita (esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)
- jos sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut syöpä
- jos sinulla on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippeliskleroosi).

Lääkärin pitää tutkia sinulta tuberkuloosin oireet ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Saat tarvita hoitoa tuberkuloosiin ennen Idacio®-hoidon aloittamista.

### **Rokotukset**

- Sinulle voidaan antaa rokotuksia, mutta ei eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
- Jos saat Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä on tärkeää kertoa lapsesi lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia vastaan) 5 kuukauteen raskauden aikana viimeksi saamastasi Idacio®-injektiosta.

### **Idacio®-hoidon aikana**

Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti ja on sinulle turvallinen, käy lääkärissä säännöllisesti keskustelemassa voinnistasi. Kerro lääkärille heti, jos voinnissasi tapahtuu muutoksia.

Pidä hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten Idacio®-hoito vaikuttaa vointiisi.

- On tärkeää, että soitat heti hoitavalle lääkärille, jos huomaat epätavallisia oireita, jotta saat

varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa. Näin myös haittavaikutusten pahenemisen todennäköisyys vähenee.

- Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan hoitaa, jos kerrot niistä heti lääkärille.
- Jos sinulla ilmenee jokin haittavaikutus, lääkäri päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoasi vai lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin kanssa, mikä sopii sinulle.

- Haittavaikutuksia voi ilmaantua viimeisen Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro oireista lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.

### **Kerro lääkärille**

- sinulla mahdollisesti ilmenevistä uusista sairauksista
- mahdollisesti käyttämistäsi uusista lääkkeitä
- sinulle mahdollisesti suunniteltavista leikkauksista tai toimenpiteistä.

**Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita voivat olla:**

#### **Infektiot**

- IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®-hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla todennäköisempää. Tällaisia infektiota voivat olla esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.



Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa  
00520 Helsinki

Lisätietoja:

P: 09-4281 550

@: asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

BI430-11-2019-v02  
hyväksytty 12/2019

