

Idacio[®] potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen lapsesi Idacio[®]-hoitoa ja sen aikana.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi).

Idacio[®]

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen lapsesi Idacio®-hoitoa ja sen aikana.

- Pidä tämä kortti mukanasasi / lapsen mukana aina ja vielä 70 päivän ajan lapsen viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti kaikille lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla lapsi käy.
- Merkitse lapselle tehdyt tuberkuloositestit ja tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito tämän kortin takasivulle.

Johdanto

IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu immuunijärjestelmän erääseen osaan vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon. Idacio® voi tehot näiden sairauksien hoitoon, mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat olla kullakin henkilöllä erilaisia.

- Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon haittavaikutuksista.
- Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm. infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

Ennen Idacio®-hoitoa

Kerro lastasi hoitavalle lääkärille lapsella mahdollisesti jo olevista sairauksista ja hänen mahdollisesti käyttämistään lääkkeitä, jotta voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®-hoito lapsellesi.

Kerro lasta hoitavalle lääkärille

- jos lapsella on jokin infektio tai infektion oireita (esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)
- jos lapsella on tuberkuloosi tai hän on ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
- jos lapsella on tai on aiemmin ollut syöpä
- jos lapsella on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippeliskleroosi).

Hoitavan lääkärin pitää tutkia lapseltasi tuberkuloosin oireet ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Lapsesi saattaa tarvita hoitoa tuberkuloosiin ennen Idacio®-hoidon aloittamista.

Rokotukset

- Lääkäri saattaa ehdottaa tiettyjen rokotusten antamista lapsellesi ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Lapselle ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita Idacio®-hoidon aikana. Jos lapsesi saa Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä on tärkeää kertoa vauvan lääkärille, ennen kuin vauva saa mitään rokotuksia. Vauvalle ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia vastaan) 5 kuukauteen lapsesi raskauden aikana viimeksi saamasta Idacio®-injektiosta.

Idacio®-hoidon aikana

Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti ja on lapsellesi turvallinen, käykää lääkärissä säännöllisesti keskustelemassa lapsesi voinnista. Kerro lääkärille heti, jos lapsen voinnissa tapahtuu muutoksia.

Pidä lasta hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten Idacio®-hoito vaikuttaa lapseesi.

- On tärkeää, että soitat heti lasta hoitavalle lääkärille, jos huomaat epätavallisia oireita,

jotta lapsi saa varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa. Näin myös haittavaikutusten pahenemisen todennäköisyys vähenee.

- Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan hoitaa, jos kerrot niistä heti lapsen lääkärille.
- Jos lapsellasi ilmenee jokin haittavaikutus, lapsen lääkäri päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoa vai lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin kanssa, mikä lapsellesi sopii.

- Haittavaikutuksia voi ilmaantua lapselle annetun viimeisen Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro lapselle ilmaantuvista oireista lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.

Kerro lapsesi lääkärille

- lapsella mahdollisesti ilmenevistä uusista sairauksista
- lapsen mahdollisesti käyttämistä uusista lääkkeitä
- lapselle mahdollisesti suunniteltavista leikkauksista tai toimenpiteistä.

Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita voivat olla:

Infektiot

- IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®-hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla lapsellasi todennäköisempää. Tällaisia infektioita voivat olla esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.

Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa
00520 Helsinki

Lisätietoja:

P: 09-4281 550

@: asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

BI432-11-2019-v02
hyväksytty 12/2019

