

ILUVIEN® TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA SISÄLTÄVÄ POTILAAN KOULUTUS- MATERIAALI



Voit kuunnella nämä tiedot äänitallenteena skannaamalla älypuhelimella tämän selosteen oikeassa yläkulmassa olevan QR-koodin.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää silmälääkäriltä tai Alimeralta suurikirjaimisen painetun version. Alimeran yhteystiedot ovat jäljempänä.

TÄRKEITÄ TIETOJA ILUVIEN-IMPLANTAATIN ASETTAMISEN JÄLKEEN SILMISSÄ MAHDOLLISESTI TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA

Injektio saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa silmään infektion tai verkkokalvon muutoksia.

JOS SINULLA ON SEURAAVIA OIREITA, HAKEUDU KIIREELLISESTI LÄÄKÄRIIN:

- näkökyvyn sumenemista tai heikkenemistä
- silmäkipua
- silmän pahenevaa punoitusta
- pilkkuja näkökentässä
- silmien valoyliherkkyys lisääntyy injektion jälkeen
- valon välähdyksiä
- näkökentästä puuttuu osa
- näön vääristyminen tai muu näköhäiriö
- silmän pinnan turpoamista (sarveiskalvoturvotus)
- silmän etuosan poikkeava ulkonäkö.

ILUVIEN-injektiosta voi aiheutua myös

- silmänpaineen nousua
- silmän mykiön samentumista (kaihi).

Sinun on siksi käytävä hoitopaikassa vastaanottokäynneillä, jotta lääkäri voi seurata vointiasi säännöllisesti.

Lue täydelliset turvallisuutta koskevat tiedot ILUVIEN-implantaatin pakkausselosteesta.

Se on saatavissa osoitteesta www.fimea.fi

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa.

Lääkäri:

Puhelin:

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle: [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

Haittavaikutukset voidaan raportoida myös osoitteeseen:
Alimera Sciences Europe Limited
Sähköposti: pvalimerasciences@alimerasciences.com