

ILUVIEN®

**UTBILDNINGSMATERIAL FÖR
PATIENTER
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION**



Genom att skanna QR-koden uppe i högra hörnet med din smartphone får du tillgång till en ljudversion av denna information.

Du kan också be om att få en större pappersversion av din ögonläkare eller av Alimera (kontaktuppgifter nedan).

**DET ÄR VIKTIGT ATT DU ÄR MEDVETEN OM
EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I DITT ÖGA
EFTER ILUVIEN-INJEKTIONEN**

I sällsynta fall kan injektionen orsaka en infektion inuti ögat eller förändringar på näthinnan.

**SÖK LÄKARVÅRD OMEDELBART OM DU
UPPLEVER NÅGOT AV FÖLJANDE TECKEN ELLER
SYM TOM:**

- grumlig eller nedsatt syn
- smärta i ögat
- förvärrad rodnad i ögat
- känsla av prickar eller fläckar framför ögat
- ökad ljuskänslighet efter injektionen
- ljusblixtar
- delvis blockerat synfält
- förvrängd syn eller andra synstörningar
- svullnad av ögats yta (hornhinneödem)
- förändringar av utseendet i ögats främre del

ILUVIEN-injektion kan också ge upphov till

- ökat tryck i ögat
- grumling av ögats naturliga lins (katarakt).

Därför måste du följas upp av din läkare med besök på kliniken.

Läs hela bipacksedeln för ILUVIEN för fullständig säkerhetsinformation.

Bipacksedeln finns på www.fimea.fi

Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Läkare:

Tel:

Du kan också rapportera biverkningar direkt till
webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

Biverkningar kan också rapporteras till:

Alimera Sciences Europe Limited

E-post: pvalimerasciences@alimerasciences.com