

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läkarens namn:

Telefonnummer under kontorstid:

Sjukhusets telefonnummer:

Telefonnummer utanför kontorstid:

PATIENTUPPGIFTER

Namn:

Telefonnummer:

Anhörig/kontaktperson vid nödsituation

Namn:

Telefonnummer:

Viktig information för patienter och deras anhöriga

- Tremelimumab kan orsaka biverkningar som kräver omedelbar medicinsk behandling för att förhindra att de förvärras.
- Kontakta sjukvård om du är osäker på dina symtom.
- Biverkningar kan förekomma veckor och månader efter avslutad behandling.
- Se Imjudo bipacksedeln för ytterligare information www.fimea.fi.
- Patienter visa detta kort för varje läkare du diskuterar med.

Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med tremelimumab, som kan orsaka immunmedierade biverkningar.
- Tidig diagnos och lämplig hantering är nödvändigt för att minimera potentiellt livshotande komplikationer.
- Konsultation med onkolog eller patientens vårdteam kan vara lämpligt vid behandling av immunmedierade biverkningar.

IMJUDO (tremelimumab) Patientkort

Detta patientkort är riktat till patienter som förskrivits tremelimumab och deras anhöriga. Patienter ska alltid ha detta kort med sig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Vad du ska göra ifall du misstänker en biverkning (även om den inte nämns i detta kort eller i bipacksedeln)

- Kontakta omedelbart sjukvård eller uppsök läkarvård om du upplever biverkningar.
- Behandla INTE dina symtom på egen hand innan du diskuterat med läkare.
- Var INTE orolig över att störa din läkare.

Symtom som kan verka milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.

Möjliga symtom

ÖGON

- Dimsyn
- Dubbelsyn
- Gula ögonvitor

BRÖSTKORG

- Bröstsmärta
- Oregelbundna eller snabba hjärtslag
- Andningssvårigheter
- Ny eller förvärrad hosta

MAGSÄCK OCH TARMAR

- Ihållande buksmärta
- Kraftigt illamående eller kräkning
- Diarré
- Svår förstoppning

MUSKLER OCH LEDER

- Ihållande eller svår muskelsmärta, muskelsvaghet eller förlamning
- Stelhet i axlar, nacke eller höft
- Stickningar eller domningar i armar eller ben

HUD

- Gul hud
- Hudutslag och/eller klåda
- Ökade svettningar

ALLMÄNNA SYMTOM

- Feber
- Svår huvudvärk
- Förvirring
- Yrsel
- Extrem trötthet
- Oförklarlig viktninskning
- Svullnad i fotleder
- Blod i urin