

POTILAAN MUISTUTUSKORTTI

Lääkärin nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Isotretinoin Actavista ei saa käyttää raskauden aikana.

Isotretinoin Actavis voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti, mikäli raskaana oleva nainen käyttää lääkettä.

Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Isotretinoin Actaviksen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita Isotretinoin Actaviksen käytöstä, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

MITÄ SINUN TULEE TEHDÄ, JOS VOIT TULLA RASKAAKSI:

- > Sinun tulee käyttää vähintään yhtä (1) todella tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten kohdun sisäistä laitetta tai implanttia) tai käyttää kahta (2) tehokasta ehkäisymenetelmää oikein, jotka toimivat eritavoin (kuten suun kautta otettavaa ehkäisyvalmistetta yhdessä kondomin kanssa) ennen hoitoa, hoidon aikana sekä yhden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.
- > **Sinä et saa tulla raskaaksi** Isotretinoin Actavis -valmisteen käytön aikana tai yhteen kuukauteen hoidon lopettamisen jälkeen.
- > **Sinun tulee osallistua säännöllisiin seurantakäynteihin ja raskaustesteihin:**
 - Ennen hoidon aloittamista sinun tulee tehdä raskaustesti, jonka tulee olla negatiivinen.
 - Varmistaaksesi, että et ole raskaana hoidon aikana sinun tulee tehdä raskaustestejä, mieluiten kuukausittain. Sinun tulee myös tehdä viimeinen raskaustesti yksi kuukausi hoidon lopettamisen jälkeen.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty ainoastaan sinulle, **älä anna sitä muille ja palauta mahdollisesti jäljääneet kapselit takaisin apteekkiin.**