

Turvallisuuden liittyviä neuvoja potilaille.
Ole hyvä ja pidä tämä kortti aina mukanasasi.

Potilas kortti

Tärkeitä turvallisuustietoja ensihoitajille

Tolvaptaani voi aiheuttaa maksavaurion. Maksakokeet on tehtävä säännöllisesti (ensimmäisen 18 kuukauden aikana kuukausittain ja sen jälkeen 3 kuukauden välein). Jos hoidon aikana havaitaan maksavaurioon viittaavia oireita tai merkkejä tai poikkeavan suuria ALAT- tai ASAT-arvoja, Jinarc-hoito tolvaptaanihoito on keskeytettävä välittömästi.

Tolvaptaani voi lisätä virtsaneritystä merkittävästi. Tämä voi johtaa vaikeaan elimistön kuivumiseen tai vakavaan nestehukkaan. Nestehukan oireita voivat olla jano, suun kuivuminen, väsymys, vähentynyt virtsaneritys, päänsärky, kuiva iho, huimaus, sydämen tykyttely, sekavuus ja ihon heikko kimmoisuus.

Lisätietoja on saatavilla sivustolla www.laakeinfo.fi.

Potilaan nimi:

Tolvaptaanin ensimmäinen määräämispäivä:

Lääkärin nimi:

Sairaalan hoitokeskuksen nimi:

Hoitokeskuksen puhelinnumero:

Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille

Tolvaptaani voi vaikuttaa maksan toimintaan.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee väsymystä, ruokahaluttomuutta, vatsakipua, kuumetta, virtsan tummuutta tai ihon tai silmien keltaisuutta, vaikeaa kuivumista, pahoinvointia, oksentelua, kutinaa tai nivel- ja lihaskipua yhdessä kuumeen kanssa.

Tolvaptaani voi aiheuttaa vaikeaa elimistön kuivumista.

Juo runsaasti nesteitä kuivumisen tai voimakkaan nestehukan estämiseksi ja ota yhteys lääkäriin, jos et pysty nauttimaan nesteitä suun kautta.