

Patientkort

VIKTIG INFORMATION OM MITOXANTRON OCH RISKEN FÖR HJÄRTPROBLEM OCH BLODCANCER (AML) VID BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS

Mitoxantron ökar risken för att få hjärtproblem och blodcancer (AML).

Det är mycket viktigt att du är införstådd med när du kan löpa högre risk för hjärtproblem och blodcancer (AML), vilka tecken och symtom som du behöver vara uppmärksam på och vilka åtgärder du måste vidta.

I vilka situationer är risken för hjärtproblem störst?

Risken för att få hjärtproblem är störst om du

- tidigare har behandlats med cancerläkemedel av typen antracykliner eller antracenedioner
- har fått strålbehandling av bröstkorgen
- har en befintlig hjärtsjukdom
- har använt eller använder läkemedel som kan påverka hjärtat

I vilka situationer är risken för blodcancer (AML) störst?

Risken för att få blodcancer (AML) är störst om du

- tidigare har behandlats med cancerläkemedel av typen antracykliner eller antracenedioner
- har fått strålbehandling av bröstkorgen

Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

Hjärtproblem:

- andfåddhet
- svullnad i vrister och fötter
- plötslig viktuppgång
- snabba hjärtslag eller hjärtklappning

Blodcancer (AML):

- ovanlig trötthet eller svaghet
- ökat antal infektioner
- lätt att få blåmärken eller börja blöda
- feber
- skelettsmärta
- andningssvårigheter
- oförklarlig viktnedgång
- nattliga svettningar

Kom ihåg att tala om för din läkare innan du börjar ta mitoxantron om du har:

- fått mitoxantron tidigare
- hjärtproblem

- problem med levern
- problem med njurarna
- lågt antal blodkroppar
- en infektion
- fått strålbehandling av bröstkorgen
- andra medicinska tillstånd

Läs i medföljande bipacksedel för mer information eller gå till [behörig myndighets webbplats].

Om du misstänker att du har fått en biverkning som förknippas med användningen av mitoxantron kan du rapportera till sjukvårdspersonal eller till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB 55, 00034 Fimea. www.fimea.fi.