

**Raskaus:** IV-rautaa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, on tärkeää keskustella asiasta oman lääkärisi kanssa.

**Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos**

- sinulle kehittyi merkkejä tai oireita allergisesta reaktiosta IV-raudalla hoidon aikana tai pian sen jälkeen.

Esimerkkejä: nokkosihottuma tai ihottuma, kutina, huimaus, pyöritys, huulten, kielen, nielun tai kehon turvotus, hengitysvaikeudet, hengenahdistus tai hengityksen vinkuminen. Lääkäri ja hoitohenkilökunta ovat tietoisia näistä mahdollisista haittavaikutuksista, ja vointiasi seurataan IV-raudan antamisen aikana ja sen jälkeen.

**Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus  
Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
FI-00034 Fimea

27.01.2023 version 1

# Laskimon- sisäinen (IV) rauta

**Tärkeää tietoa potilaille vakavien allergisten reaktioiden mahdollisesta riskistä IV-raudahoidon yhteydessä (pistoksena tai infuusiona laskimoon annettava rauta)**

rautakarboksimaltoosi, rautadekstraani,  
rautaderisomaltoosi, rautasakkaroosi

**Lue tämä esite huolellisesti ja keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on kysyttävää.**

**Lue myös sinulle määrätyn IV-raudan mukana toimitettu pakkausseloste. Se sisältää tärkeitä lisätietoja lääkkeestä.**

**IV-rautaa** käytetään raudanpuutostilan hoitoon, kun suun kautta otetut rautavalmisteet eivät ole toimineet tai niitä ei voida käyttää. Hoidon tavoitteena on täydentää kehon rautavarastoa.

**IV-rauta** voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Pienellä osalla potilaista nämä allergiset reaktiot voivat muuttua vakaviksi tai hengenvaarallisiksi (tunnetaan nimellä anafylaktiset reaktiot) ja ne voivat aiheuttaa ongelmia sydämellesi ja verenpaineelle ja/tai aiheuttaa pyörtymisen tai tajunnan menetyksen.

**Sinulle ei saa määrätä tai antaa IV-rautaa, jos**

- olet allerginen (yliherkkä) tälle lääkevalmisteelle tai sen jollekin muulle ainesosalle
- sinulla on aiemmin ollut vakavia allergisia (yliherkkyys-) reaktioita muihin IV-rautahoitoihin\*
- sinulla on raudan ylikuormitus (liikaa rautaa elimistössäsi)
- anemiasi johtuu muusta syystä kuin raudanpuutteesta.

**Kerro lääkärillesi ennen IV-raudan määräämistä/antamista**, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai sairauksista.

**\* On tärkeää tietää, että reaktio voi silti ilmaantua, vaikka sinulla ei olisi aiemmin ollut ongelmia IV-raudan kanssa.**

**Sinulla voi olla lisääntynyt allergisen reaktion riski, jos sinulla on**

- tunnettuja allergioita, mukaan lukien lääkeaineallergiat
- aiemmin ollut vaikea astma, ekseema tai muita allergioita (esimerkiksi pölylle, siitepölylle, lemmikkieläinten hilseelle)
- immuunivaste- tai tulehdustiloja (esimerkiksi nivelreuma, lupus erythematosus)

**Kerro lääkärille ennen IV-raudan määräämistä tai antamista**, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai sairauksista. Lääkäri päättää, sopiiko IV-rauta sinulle.