

**Graviditet:** IV-järn ska inte användas under graviditet såvida det inte är klart nödvändigt. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid är det viktigt att diskutera detta med din läkare.

**Du bör omedelbart kontakta läkare eller sjuksköterska om:**

- du upplever tecken eller symptom på en allergisk reaktion under eller strax efter behandling med IV-järn

Till exempel: nässelfeber eller utslag, klåda, yrsel, svimningskänsla, svullnad av läppar, tunga, hals eller kropp, andningssvårigheter, andfåddhet eller väsende andning.

Läkaren eller vårdpersonalen är medvetna om dessa möjliga biverkningar och du kommer att övervakas under och efter det att du mottagit intravenöst järn.

**Rapportering av biverkningar**

Du kan hjälpa till genom att rapportera alla biverkningar som du upplever. Tala med din läkare eller sjuksköterska om du upplever biverkningar. Detta inkluderar alla möjliga biverkningar även om de inte är listade i denna broschyr . Du kan även rapportera biverkningar direkt via webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  
Fimea Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

27.01.2023 version 1

# Intravenöst (IV) järn

**Viktig patientinformation om möjliga risker för allvarliga allergiska reaktioner med IV-järnbehandling (järn som injiceras eller infuseras i en ven)**

järnkarboxymaltos, järndextran,  
järnderisomaltos, järnsackaros

**Läs igenom denna broschyr noga och diskutera alla frågor som du har med din läkare.**

**Du bör även läsa bipacksedeln som medföljer det enskilda IV-järnpreparatet som du har förskrivits. Denna innehåller viktig ytterligare information gällande läkemedlet.**

**IV-järn** används för att behandla järnbrist när järnpreparat som tas oralt inte har fungerat eller inte kan användas.

Syftet med behandlingen är att fylla på kroppens järndepåer

**IV-järn** kan orsaka allergiska reaktioner.

Hos ett litet antal patienter kan dessa allergiska reaktioner bli allvarliga eller livshotande (kända som anafylaktiska reaktioner) och kan leda till problem med hjärtat eller blodtrycket och/eller leda till att du svimmar eller förlorar medvetandet.

### **Du bör inte förskrivas eller ges IV-järn om:**

- du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller någon av ingredienserna i detta läkemedel
- du har upplevt allvarliga allergiska (överkänslighets-) reaktioner mot andra IV-järnbehandlingar tidigare\*
- du har överskott av järn (för mycket järn i kroppen)
- din anemi inte orsakats av järnbrist.

**Du bör berätta för din läkare innan han/hon förskriver/administrerar ett IV-järnpreparat** om du har någon av dessa allergier eller tillstånd.

**\* Det är viktigt att känna till att en reaktion fortfarande kan uppstå även om du tidigare inte haft problem med IV-järn.**

### **Du kan ha en ökad risk för en allergisk reaktion om du har:**

- kända allergier, inklusive läkemedelsallergier
- en historik med allvarlig astma, eksem eller andra allergier (till exempel damm, pollen, djurallergi)
- immun- eller inflammatoriska sjukdomar (t.ex. reumatoid artrit, lupus erythematosus).

**Du bör berätta för din läkare innan han/hon förskriver eller ger dig IV-järnpreparat** om du har någon av dessa allergier eller något av dessa tillstånd.

Din läkare beslutar om IV-järn är lämpligt för dig.