

7. Mitä muuta Natriumoksibaatti Kalceks-hoidosta on tärkeä tietää?

- Älä anna Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta kenellekään muulle.
- Käytä lääkettä vain lääkärin määräämin annoksin. Jos annosta tulee mielestäsi muuttaa, ota yhteyttä lääkäriisi.
- Ota Natriumoksibaatti Kalceks-annos aina aikaisintaan 2 tunnin kuluttua päivän viimeisen aterian jälkeen.
- Säilytä Natriumoksibaatti Kalceks aina alkuperäispakkauksessaan turvallisessa paikassa.
- Säilytä Natriumoksibaatti Kalceks lasten ulottumattomissa.
- Palauta käyttämättä jäänyt lääke apteekkiisi.
- Ilmoita lääkärille heti, jos sinulla esiintyy Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aikana epätavallisia oireita, kuten outoja ajatuksia, mukaan lukien ajatuksia muiden ihmisten vahingoittamisesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös AS Kalceks vastuuhenkilö

Pharmacovigilance: vigilance@grindeks.com

Tel: +371 22038854

Tärkeää tietoa potilaiden riskin minimoinnista: Natriumoksibaatti Kalceks Usein kysytyt kysymykset Tietosivu

Tässä oppaassa on kysymyksiä ja vastauksia Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteesta ja sen käytöstä. Pyydämme sinua keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa muista mahdollisista kysymyksistä sekä perehtymään Natriumoksibaatti Kalceks-pakkauksessa olevaan pakkausselosteeseen.

1. Mitä Natriumoksibaatti Kalceks on?

Natriumoksibaatti Kalceks on suun kautta otettava reseptilääke, jota käytetään hoidettaessa aikuisia:

- jotka nukahtavat päivän aikana tiheästi ja odottamattomina ajankohtina (narkolepsia);
- joilla on lihasten äkillistä heikkoutta tai lamaanutumista voimakkaiden tunnetilojen yhteydessä (katapleksia).

2. Voiko Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aikana nauttia alkoholia?

Ei, Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aikana ei saa nauttia alkoholia. Alkoholi voi voimistaa Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon vaikutuksia ja vaikeuttaa hengitystä (ns. hengityslama), mikä voi olla hengenvaarallista. Myös ajatustoiminnan häiriöitä tai sekavuutta voi esiintyä.

3. Mitkä ovat Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteen vakavat haittavaikutukset?

Hengitysvaikeudet (hengityslama)

Natriumoksibaatti Kalceks voi vaikuttaa hengitystoimintaan. Jos sinulla on hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia, sinun tulee kertoa niistä lääkärille ennen Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aloittamista. Jos olet ylipainoinen, hengityslaman riski on myös tällöin tavallista suurempi. Myöskään alkoholia ei tule nauttia, koska se saattaa suurentaa hengityslaman riskiä. Hengityslama voi olla vakava ja jopa hengenvaarallinen.

Masennus ja itsetuhoiset ajatukset

Jos tunnet itsesi masentuneeksi tai sinulla on itsetuhoisia ajatuksia Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aikana, kerro asiasta heti lääkärillesi. Sinun tulee kertoa hänelle myös, jos sinulla on ollut masennusta aiemmin.

Tajunnan tason lasku

Koska Natriumoksibaatti Kalceks vaikuttaa suoraan aivoihin, se aiheuttaa uneliaisuutta ja saattaa laskea tajunnan tasoa. Tämä voi johtaa koomaan ja olla hengenvaarallista. On tärkeää, että Natriumoksibaatti Kalceks-lääkityksen aikana ei nautita alkoholia. Mitään muita uneliaisuutta aiheuttavia lääkkeitä ei tule käyttää. Vältä myös autolla ajoa ja koneiden käyttöä vähintään 6 tunnin ajan Natriumoksibaatti Kalceks-annoksen ottamisen jälkeen.

Kouristuskohtaukset

Natriumoksibaatti Kalceks voi aiheuttaa kouristuskohtauksia. Kerro lääkärille Ennen Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon aloittamista, jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia aiemmin.

Riippuvuus, väärinkäyttö ja virheellinen käyttö

Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteen vaikuttava aine on gammahydroksibutyraatti (GHB). GHB on kemiallinen aine, johon on liittynyt väärinkäyttöä ja virheellistä käyttöä. Siksi lääkärisi kysyy sinulta erityisesti, oletko aiemmin käyttänyt lääkkeitä väärin. Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteen väärinkäyttö ja virheellinen käyttö on vaarallista ja voi johtaa jopa kuolemaan.

Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteen haittavaikutukset eivät rajoitu vain edellä mainittuihin. Pyydämme kääntymään lääkärisi puoleen, jos haluat lisätietoa haittavaikutuksista.

4. Voiko Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta käyttää turvallisesti muiden lääkkeiden kanssa?

Kuten kaikkien lääkkeiden käytön yhteydessä, on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muista käyttämästäsi lääkkeitä, myös ns. itsehoitolääkkeistä. Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta ei tule käyttää yhdessä uneliaisuutta aiheuttavien lääkkeiden kanssa, eikä, esim. narkoottisten kipulääkkeiden tai muiden lääkkeiden, jotka voivat lamata keskushermostoa. Muista kertoa lääkärille, jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat keskushermoston toimintaan (masennuslääkkeet, valproaatti, topiramaatti, fenytoiini tai etosuksimidi).

Pyydä terveydenhoidon ammattilaiselta Natriumoksibaatti Kalceks-potilaskortti, ja pidä se aina mukana muistuttamassa Natriumoksibaatti Kalceks-hoidosta. Esitä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille, jotta he tietävät sinun käyttävän Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta, erityisesti, jos sinulle ollaan määräämässä muita lääkkeitä.

5. Mitä teen, jos otan Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta vahingossa enemmän kuin minulle on määrätty?

Hakeudu välittömästi ensiapuun, jos otat liikaa Natriumoksibaatti Kalceks-valmistetta (yliannostus). Natriumoksibaatti Kalceks-valmisteen yliannostuksen oireita voivat olla kiihtymys, sekavuus, liikehäiriöt, hengitysvaikeudet, näön hämärtyminen, runsas hikoilu, päänsärky, oksentelu ja koomaan johtava tajunnan tason lasku sekä kouristuskohtaukset. Hoitohenkilökunnan on helpompi hoitaa oireitasi, jos otat mukaasi etiketillä varustetun lääkepullon, vaikka se olisi tyhjäkin.

6. Entä, jos keskeytän Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon äkillisesti?

Natriumoksibaatti Kalceks-hoidon äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita. Katapleksiaoireet saattavat uusiutua, ja joissain harvoissa tapauksissa saattaa esiintyä unettomuutta, päänsärkyä, ahdistuneisuutta, heitehuimausta, univaikeuksia, uneliaisuutta, aistiharhoja ja epänormaaleja ajatuksia.