

7. Vilka andra viktiga saker behöver jag veta om att ta Natriumoksibaatti Kalceks?

- Dela inte Natriumoksibaatti Kalceks med någon.
- Använd endast den dos som din läkare skrivit ut till dig. Om du anser att dosen behöver ändras, kontakta din läkare.
- Var noga med att vänta minst 2 timmar efter en måltid innan du tar Natriumoksibaatti Kalceks.
- Förvara alltid Natriumoksibaatti Kalceks på en säker plats i originalförpackningen.
- Förvara Natriumoksibaatti Kalceks utom syn- och räckhåll för barn
- Lämna tillbaka oanvänt läkemedel till ditt apotek.
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Natriumoksibaatti Kalceks.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

webbplats: www.fimea.fi.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,
Biverkningsregistret PB 55, 00034 FIMEA

Du kan också rapportera biverkningar till AS Kalceks ansvarig person för
Pharmacovigilance: vigilance@grindeks.com
Tel: +371 22038854

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Viktig information om riskminimering för patienter: Natriumoksibaatti Kalceks Vanliga frågor informationsguide

Här är några frågor som du kanske har angående ditt intag av Natriumoksibaatti Kalceks. Prata med sjukvårdspersonal angående andra eventuella frågor du har, och läs igenom bipacksedeln som kom tillsammans med flaskan med läkemedel.

1. Vad är Natriumoksibaatti Kalceks?

Natriumoksibaatti Kalceks är ett oralt receptbelagt läkemedel som används för att behandla vuxna som:

- ofta somnar dagtid och vid oväntade tillfällen (narkolepsi)
- plötsligt drabbas av muskelsvaghet eller förlamning (kataplexi) när de upplever starka känslor.

2. Får jag dricka alkohol medan jag tar Natriumoksibaatti Kalceks?

Nej, du får inte dricka alkohol medan du tar Natriumoksibaatti Kalceks. Natriumoksibaatti Kalceks effekter kan förstärkas och du kan uppleva nedsatt andning (andningsdepression) som kan vara dödlig. Du kan också uppleva nedsatt tankeförmåga eller förvirring.

3. Vilka allvarliga biverkningar har Natriumoksibaatti Kalceks?

Andningsbesvär (andningsdepression)

Natriumoksibaatti Kalceks kan påverka din andning. Om du har några andningseller lungproblem bör du informera din läkare innan du tar Natriumoksibaatti Kalceks. Om du är överviktig har du också ökad risk för andningsdepression. Du bör inte dricka alkohol eftersom detta också kan öka risken för andningsdepression. Andningsdepression kan vara allvarlig och även dödlig.

Depression och självmordstankar

Om du känner dig nedstämd eller har några tankar på att skada dig själv medan du tar Natriumoksibaatti Kalceks bör du genast informera din läkare. Du bör också informera din läkare om du tidigare har drabbats av depression.

Sänkt medvetandegrad

Eftersom Natriumoksibaatti Kalceks verkar direkt på hjärnan orsakar det dåsighet och kan sänka din medvetandegrad. Detta kan leda till koma och kan vara dödligt. Det är viktigt att du inte dricker alkohol medan du tar Natriumoksibaatti Kalceks. Du bör inte ta några andra läkemedel som orsakar dåsighet. Du bör inte heller köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter att du tagit Natriumoksibaatti Kalceks.

Epileptiska anfall

Natriumoksibaatti Kalceks kan orsaka epileptiska anfall. Innan du tar Natriumoksibaatti Kalceks bör du tala om för din läkare om du har haft epileptiska anfall tidigare.

Beroende/missbruk/felanvändning

Den aktiva substansen i Natriumoksibaatti Kalceks är gamma-natriumoxibat (GHB). GHB är en substans som har missbrukats och felanvänts. Din läkare kommer därför att specifikt fråga dig om du har missbrukat läkemedel tidigare. Missbruk och felanvändning av Natriumoksibaatti Kalceks är farligt och kan leda till döden. Dessa är inte alla Natriumoksibaatti Kalceks biverkningar. Tala med din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

4. Är Natriumoksibaatti Kalceks säkert att använda tillsammans med andra läkemedel?

Som med alla andra läkemedel är det väldigt viktigt att du berättar för din läkare om andra läkemedel som du tar, inklusive icke-receptbelagda läkemedel. Natriumoksibaatti Kalceks bör inte användas i kombination med läkemedel som orsakar dåsighet eller med läkemedel såsom narkotiska smärtstillande medel som kan orsaka dämpning av det centrala nervsystemet. Tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet, antidepressiva läkemedel, eller läkemedel som omsättes på liknande sätt i kroppen, såsom valproat, topiramat, fenytoin eller etosuximid. Be sjukvårdspersonal om ett Natriumoksibaatti Kalceks Patientkort som du kan bära med dig för att påminna dig om hur Natriumoksibaatti Kalceks ska användas. Visa detta kort för alla läkare som behandlar dig så att de vet att du tar Natriumoksibaatti Kalceks, särskilt om de skriver ut läkemedel till dig.

5. Vad ska jag göra om jag råkar ta mer än den förskrivna dosen?

Se till att genast söka akut hjälp om du tar för mycket Natriumoksibaatti Kalceks (överdos).

Att ta för mycket Natriumoksibaatti Kalceks kan orsaka symptom såsom agitation, förvirring, försämrad rörlighet, försämrad andning, suddig syn, överdriven svettning, huvudvärk, kräkningar och sänkt medvetandegrad vilket kan leda till koma och epileptiska anfall. Det underlättar för sjukvårdspersonalen att ta hand om dina symptom om du tar med dig den märkta läkemedelsflaskan, även om den är tom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar att ta Natriumoksibaatti Kalceks?

Om du plötsligt slutar att ta Natriumoksibaatti Kalceks kan du uppleva abstinens. Du kanske märker att de kataplektiska anfällen återkommer och, i ovanliga fall kan du drabbas av sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnsvårigheter, trötthet, hallucinationer och onormala tankar.