

#### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös AS Kalceks vastuhenkilö

Pharmacovigilance: [vigilance@grindeks.lv](mailto:vigilance@grindeks.lv)

Tel: +371 22038854

# Tärkeää tietoa potilaiden riskin minimoinnista: Natriumoksibaatti Kalceks- valmistetta

Natriumoksibaatti Kalceks-pakkaus sisältää yhden pullon, pulloon painettavan adapterin, asteikolla varustetun annostelupipetin ja kaksi annosmittaa, joissa on turvasulkimet sekä pakkausseloste.



Ennen kuin otat ensimmäisen Natriumoksibaatti Kalceks-annoksen, lue pakkausseloste, sillä se sisältää tärkeää lisätietoa.

Ota Natriumoksibaatti Kalceks juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Potilasesite.V1. hyväksymä FIMEA 11/2019.

## Natriumoksibaatti Kalceks valmistelu.

Valmista molemmat annokset ennen nukkumaan menoa.

### Vaihe 1 (Kuva 1)

Poista pullon suljin painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä sitä vastapäivään (vasemmalle). Poistettuasi suljimen aseta pullo pöydälle pystyasentoon. Pidä pullo pystyasennossa ja työnnä pulloon painettava adapteri pullon kaulaan. Tämä tehdään vain, kun pullo avataan ensimmäisen kerran. Adapteri voidaan jättää pulloon myöhempiä käyttökertoja varten.

Kuva 1



### Vaihe 2 (Kuva 2)

Työnnä annostelupipetin kärki pullonsuun keskustassa olevaan aukkoon ja paina lujasti alaspäin (ks. kuva 2). Varmista, että annostelupipetti on tiukasti kiinni.


Kuva 2



### Vaihe 3 (Kuva 3)

Täytä pipetti kääntämällä pullo ylösalaisin. Pidä pipettiä paikallaan ja vedä mäntää varovasti alaspäin niin että pipettiin tulee ohjeenmukainen lääkeannos (katso kuva 3).

Kuva 3



### Vaihe 4 (Kuva 4)

Käännä pullo oikein päin. Irrota pipetti pullon keskiaukosta. Tyhjennä lääke pipetistä yhteen annosmittaan työntämällä mäntää (ks. Kuva 4). Toista tämä vaihe toiselle annosmitalle. Lisää sitten noin 60 ml vettä jokaiseen annosmittaan (60 ml on noin 4 ruokalusikallista).

Kuva 4



### Vaihe 5 (Kuva 5)

Pane annosmittoihin suljimet kiertämällä myötäpäivään (oikealle), kunnes kuuluu napsahdus ja suljin lukittuu lapsiturvallisesti (ks. kuva 5). Huuhtele pipetti vedellä.

Kuva 5



### Vaihe 6 (Kuva 6)

Aseta toinen annos vuoteesi lähelle juuri ennen nukkumaan menoa. Sinun on ehkä pantava herätyskello soimaan, jotta heräisit ottamaan toisen annoksen aikaisintaan 2,5 tunnin ja viimeistään 4 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Poista ensimmäisen annosmitan suljin painamalla turvalukitusnippukkaa ja kiertämällä suljinta vastapäivään (vasemmalle). Ota ensimmäinen annos vuoteessa istuen, laita suljin takaisin paikoilleen, ja asetu heti makuulle.

Kuva 6



### Vaihe 7

Kun heräät 2,5–4 tunnin kuluttua, avaa toisen annosmitan suljin. Ota toinen annos vuoteessa istuen, asetu heti makuulle ja jatka uniasi. Laita toisen mitan suljin takaisin paikoilleen.

Katso yksityiskohtaiset tiedot kaikista oppaista: Natriumoksibaatti Kalceks - valmistelut, joissa on Natriumoksibaatti Kalceks-sovellus, ja niitä voidaan käyttää yhdessä apteekien kanssa.