

POTILAAN MUISTUTUSKORTTI

Lääkärin nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Neotigasonia (asitretiini) ei saa käyttää raskauden aikana.

Neotigason (asitretiini) voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti, mikäli raskaana oleva nainen käyttää lääkettä.

Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Neotigasonin (asitretiini) käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita Neotigasonin (asitretiini) käytöstä, keskustele lääkärin tai apteekkien henkilökunnan kanssa.

Mitä sinun tulee tehdä, jos voit tulla raskaaksi:

- > Sinun tulee käyttää vähintään yhtä (1) todella tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten kohdun sisäistä laitetta tai implanttia) tai käyttää kahta (2) tehokasta ehkäisymenetelmää oikein, jotka toimivat eritavoin (kuten suun kautta otettavaa ehkäisyvalmistetta yhdessä kondomin kanssa) ennen hoitoa, hoidon aikana sekä kolmen vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.
- > Sinä et saa tulla raskaaksi Neotigason -valmisteen käytön aikana tai kolmeen vuoteen hoidon lopettamisen jälkeen.
- > Sinun tulee osallistua säännöllisiin seurantakäynteihin ja raskaustesteihin:
 - Ennen hoidon aloittamista sinun tulee tehdä raskaustesti, jonka tulee olla negatiivinen
 - Varmistaaksesi, että et ole raskaana hoidon aikana sinun tulee tehdä raskaustestejä, mieluiten kuukausittain. Sinun tulee myös tehdä raskaustestejä 1–3 kuukauden välein kolmen vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty ainoastaan sinulle, **älä anna sitä muille ja palauta mahdollisesti ylijääneet kapselit takaisin apteekkiin.**

Päivitetty viimeksi: syyskuu 2025