

# PÅMINNELSEKORT FÖR PATIENTEN

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Neotigason (acitretin) får inte tas under pågående graviditet.

Om en gravid kvinna tar Neotigason (acitretin) kan det allvarligt skada det födda barnet.

**Om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid, ska du omedelbart sluta ta Neotigason (acitretin) och kontakta läkare.**

Läs bipacksedeln noga innan du påbörjar behandlingen.

**Om du har några frågor om, eller är orolig över att ta Neotigason (acitretin), tala med läkare eller apotekspersonal.**

## VAD DU BÖR GÖRA OM DET FINNS EN MÖJLIGHET ATT DU SKULLE KUNNA BLI GRAVID:

- > Du måste använda åtminstone en (1) mycket effektiv preventivmetod (t.ex. intrauterint inlägg eller implantat) eller använda två (2) effektiva preventivmetoder som fungerar på olika sätt (t.ex. något preventivmedel som tas via munnen i kombination med kondom) på ett korrekt vis innan behandlingen inleds, under tiden du behandlas, och i 3 års tid efter att du avslutat behandlingen.
- > Du får inte bli gravid under den tid då du tar Neotigason, eller under en period på 3 år efter att du har avslutat behandlingen.
- > Du måste gå på regelbundna uppföljningsbesök och måste göra regelbundna graviditetstester:
  - Innan du påbörjar behandlingen måste du göra ett graviditetstest, som ska vara negativt.
  - För att säkerställa att du inte är gravid under tiden du behandlas, kommer du att få göra upprepade graviditetstester, helst en gång i månaden. Du ska också göra graviditetstester med 1–3 månaders mellanrum i en period på 3 år efter att du har avslutat behandlingen.

## Påminnelse till män och kvinnor

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. **Ge det inte till någon annan och lämna in alla eventuellt överblivna kapslar till apoteket.**