

## Tietoa potilaille OLUMIANT®-lääkkeestä (barisitinibi)

Tässä potilaskortissa on tärkeää turvallisuustietoa, johon sinun on tutustuttava ennen Olumiant-hoidon aloittamista ja pidettävä mielessä hoidon aikana.

Pidä potilaskortti mukanasasi ja näytä sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

### Nimesi:

---

### Olumiant-lääkkeen määränneen lääkärin nimi:

---

### Lääkärin puhelinnumero:

---

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55, FI-00034 FIMEA

tai myyntiluvanhaltijalle:

Oy Eli Lilly Finland Ab,  
[medinfo\\_finland@lilly.com](mailto:medinfo_finland@lilly.com),

puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)

### Raskaus

- Älä käytä Olumiant-lääkettä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.
- Käytä tehokasta ehkäisyä Olumiant-hoidon aikana (ja 1 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen).
- Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi (tai suunnittelet raskautta).

### Infektiot

Olumiant voi pahentaa olemassa olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion saamisen tai virusten uudelleen aktivoitumisen mahdollisuutta. Jos sinulla on diabetes tai olet yli 65-vuotias, sinulla voi olla lisääntynyt mahdollisuus saada infektioita. Infektio voi muuttua vakavaksi, jos sitä ei hoideta. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on infektioiden oireita, esim. seuraavia:

- Kuumetta, haavoja, tavallista voimakkaampaa väsymystä tai hammasvaivoja.
- Pitkittyvää yskää, yöhikoilua ja painon laskua. Ne voivat olla tuberkuloosin (keuhkojen infektiotaudin) merkkejä.
- Kivuliasta, rakkulaista ihottumaa. Se voi olla vyöruusun merkki.

### Ei-melanoottinen ihosyöpä

Ei-melanoottisia ihosyöpiä on havaittu Olumiant-valmistetta käyttävillä potilailla. Kerro lääkärillesi, jos uusia ihovaurioita ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen tai jos olemassa olevien ihovaurioiden ulkonäkö muuttuu.

### Veritulpat

Olumiant voi aiheuttaa tilan, jossa alaraajaan muodostuu veritulppa, joka voi kulkeutua keuhkoihin. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

- turvotusta tai kipua toisessa jalassa tai käsivarressa
- kuumotusta tai punoitusta toisessa jalassa tai käsivarressa
- odottamatonta hengästymistä
- nopeaa hengitystä
- rintakipua.

### Sydänkohtaus tai aivohalvaus

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla on jokin seuraavista:

- vaikea rintakipu tai puristava tunne (joka voi levitä käsivarsiin, leukaan, kaulaan, selkään)
- hengenahdistus
- kylmä hiki
- yksipuolinen heikkous kädessä ja/tai jalassa
- sammaltava puhe.

Fimean hyväksymä 27.3.2023

V4.0 EU\_PACadditionalriskminclean