

Patientinformation om OLUMIANT® (baricitinib)

Detta dokument innehåller viktig information som du måste vara medveten om före och under behandling med Olumiant. Bär denna information med dig och visa den för hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård eller behandling.

Ditt namn:

Läkarens namn (som ordinerat Olumiant):

Läkarens telefonnummer:

Rapportering av biverkningar

Om du märker biverkningar, tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Läkemedelsbiverkningsregistret
PL 55, FI-00034 FIMEA

eller till innehavaren av försäljningstillståndet:
Oy Eli Lilly Finland Ab,
medinfo_finland@lilly.com,
Tel. 0800 140 240 (mån-fre kl. 9-15)

Graviditet

- Ta inte Olumiant om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid.
- Använd ett effektivt preventivmedel medan du tar Olumiant (och i en vecka efter behandlingens slut)
- Informera läkaren omedelbart om du blir (eller vill bli) gravid.

Infektioner

Olumiant kan göra en pågående infektion värre, öka risken för att du får en ny infektion eller öka risken för att ett virus blir aktivt igen. Om du har diabetes eller är äldre än 65 år kan du ha en ökad risk för att få infektioner. Infektioner kan bli allvariga om de inte behandlas. Informera omedelbart läkaren om du får symtom på en infektion till exempel:

- Feber, sår, känna sig tröttare än vanligt, problem med tänderna.
- Hosta som inte går över, nattliga svettningar, viktnedgång. Detta kan vara tecken på tuberkulos (en infektionssjukdom i lungorna).
- Smärtsamt hudutslag med blåsor. Detta kan vara tecken på en herpes zoster-infektion.

Icke-melanomhudcancer

Icke-melanomhudcancer har observerats hos patienter som tar Olumiant. Om nya hudförändringar uppstår under eller efter behandlingen eller om befintliga hudförändringar ändrar utseende, tala om för din läkare.

Blodproppar

Olumiant kan orsaka ett tillstånd där blodproppar bildas i benen och därefter kan föras vidare till lungorna. Informera omedelbart läkaren om du får något av följande symtom:

- Svullnad eller smärta i ett ben eller arm.
- Värmekänsla eller rodnad i ett ben eller arm.
- Plötslig andfåddhet.
- Snabb andhämtning.
- Bröstmärta.

Hjärtinfarkt eller stroke

Informera din läkare omedelbart om du upplever något av följande:

- Svår bröstsmärta eller tryckkänsla över bröstet (som kan sprida sig till armar, käke, nacke, rygg)
- Andnöd
- Kallsvett
- Ensidig svaghet i arm och/eller ben
- Sluddrigt tal.

Godkänd av Fimea 27.3.2023

V4.0 EU_PACadditionalriskminclean