

Till patienter

Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera sjukvårdspersonal att du är under behandling med nivolumab (OPDIVO®) eller nivolumab i kombination med ipilimumab (OPDIVO® + YERVOY®).

Om du upplever några tecken eller symtom, kontakta din läkare omedelbart.

⚠ VIKTIGT

Behandling med nivolumab kan öka risken för allvarliga eller livshotande immunrelaterade biverkningar som kan påverka olika delar av kroppen, till exempel:

- **Bröstkorg (hjärta och lungor):** andningssvårigheter, hosta, väsande andning, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning (ökad medvetenhet av dina hjärtslag)
- **Mage (magsäck och tarm):** diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk
- **Lever:** guldfärgade ögon eller hud (gulshot), smärta på höger sida av magtrakten
- **Njurar:** förändring av mängd och/eller frekvens av urin
- **Hormonproducerande körtlar (inklusive diabetes):** huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning (trötthet), viktförändring, beteendeförändringar (till exempel minskad sexlust, irritation eller glömska), överdriven törst, ökad aptit med viktförlust, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, förändring av mängd och/eller frekvens av urin
- **Hud:** utslag, klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor
- **Övrigt:** svaghet, utmattning (trötthet), minskad aptit, illamående, kräkning, stickningar eller domningar i armar och ben, svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, huvudvärk, krampanfall, nackstelhet, förvirring, dåsighet, muskelsmärta, stelhet, mörk urin, smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem

⚠ VIKTIGT

- Berätta för din läkare om dina tidigare medicinska tillstånd, inklusive om du har fått ett benmärgs- eller stamcellstransplantat från en annan person (allogen, celltransplantation från en annan person).
- Tidig bedömning och hantering av biverkningar, av din läkare, minskar risken för att behandlingen med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab måste stoppas tillfälligt eller permanent.
- Tecken och symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.
- Försök **inte** att behandla dessa symtom på egen hand.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent, det vill säga veckor eller månader efter sista dos.

För mer information, se OPDIVO® bipacksedel www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

Kontaktuppgifter till min läkare

(läkare som förskrivit nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab)

Läkarens namn:

Telefonnummer, kontorstid:

Telefonnummer utanför kontorstid:

Mina kontaktuppgifter

Patientens namn:

Patientens telefonnummer:

Kontaktinformation vid en nödsituation (namn och telefonnummer):

VIKTIG information till sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med **nivolumab (OPDIVO®)** eller **nivolumab i kombination med ipilimumab (OPDIVO® + YERVOY®)**.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Att konsultera en specialist inom onkologi eller annan medicinsk specialist kan vara till hjälp vid hanteringen av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- För mer information till sjukvårdspersonal, se OPDIVO® produktresumé www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

Läkare som förskriver nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab till patienten ska fylla i sektionen "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

OPDIVO®
(nivolumab)
Patientkort