

Patientkort

Sida 1

Patientkort Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till när du behandlas med Opsumit. Bär alltid med dig det här kortet och visa det för alla läkare som är involverade i din vård. Opsumit macitentan SV	Det är viktigt att du omedelbart rapporterar graviditet eller eventuella biverkningar som inträffar under behandling med Opsumit till din förskrivande läkare. Vårdinrättning: _____ Namn på förskrivande läkare: _____ Telefonnummer till förskrivande läkare: _____
--	--

Sida 2

Sida 3

Graviditet Opsumit kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Opsumit om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Opsumit. Dessutom, om du har pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i lungorna), kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom. Preventivmedel Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar Opsumit. Tala med din läkare om du har frågor om detta.	Du måste göra ett graviditetstest innan du börjar ta Opsumit och varje månad under behandlingen, även om du inte tror att du är gravid. Liksom andra läkemedel i denna grupp kan Opsumit påverka levern. Din läkare kommer att ta blodprover innan du påbörjar behandlingen med Opsumit och under behandlingen, för att kontrollera om din leverfunktion är normal.
--	---

Sida 4

Sida 5

Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara: • Illamående (önskan att kräkas) • kräkningar • feber (hög temperatur) • mag-/buksmärta • gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor) • mörkfärgad urin • kliande hud • dvalliknande tillstånd eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning) • influensaliknande symtom (led- och muskelsmärter med feber)	Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om detta för din läkare. Om du har frågor om din behandling, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
---	--

Sida 6