

Ozurdex® Potilasopas

(implantaatti silmän lasiaiseen, deksametasoni 0,7 mg)

Tämä potilasopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tulee olla tietoinen ennen Ozurdex-hoitoa ja sen jälkeen.

Miksi minun tulee lukea tämä potilasopas?	2
--	----------

Ozurdex-hoito	2
----------------------	----------

Miten minun tulee valmistautua hoitooni?	2
--	---

Mitä hoitooni kuuluu?	3
-----------------------	---

Mitä tapahtuu hoitoni jälkeen?	3
--------------------------------	---

Mistä löydän lisätietoja?	4
---------------------------	---

Miksi minun tulee lukea tämä potilasopas?

Ozurdex-hoitoon voi liittyä seuraavia riskejä:

- Kohonnut silmänpaine, joka voi johtaa glaukoomaan (silmasairaus, joka aiheuttaa näön menetystä).
- Silmänsisäinen tulehdus (yleensä infektion aiheuttama).

On tärkeää, että olet tietoinen näiden Ozurdex-hoitoon liittyvien riskien varhaisista merkeistä ja oireista, jotta voidaan ehkäistä niiden eteneminen ja minimoida niihin liittyviä vakavia seurauksia.

Ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai hoitajaasi, jos sinulle ilmenee milloin tahansa jokin/joitakin seuraavista merkeistä tai oireista Ozurdex-hoidon jälkeen:

- Heikentynyt näkö injektion jälkeen.
- Kipu tai epämukava tunne silmässä tai silmän ympärillä.
- Lasiaiskellujien tai pisteiden lisääntyminen näkökentässä.
- Sumentunut näkö, joka kestää pidempään kuin yhden päivän ajan injektion jälkeen.
- Paheneva silmän punoitus.
- Erite silmästä.

Miten minun tulee valmistautua hoitooni?

Ennen hoitoa lääkärisi antaa sinulle antibioottisilmätippoja. Sinun tulee käyttää niitä kolme päivää ennen hoitoa. Jatka silmätippojen käyttämistä vielä kolme päivää hoidon jälkeen.

Mitä hoitooni kuuluu?

Ennen hoidon aloittamista lääkäri tekee seuraavat valmistelut:

- Puhdistaa silmäsi infektion estämistä varten ja saattaa antaa lisää antibioottisilmätippoja.
- Peittää kasvosi suojaliinalla.
- Puuduttaa silmäsi puudutteella, jotta et tunne kipua.
- Käyttää laitetta, joka pitää silmäsi auki hellävaraisesti.

Tämän jälkeen lääkäri käyttää asetinta, joka on suunniteltu erityisesti tätä tarkoitusta varten, ja injektoidaan lääkkeen silmäsi valkoisen osan läpi. Tässä vaiheessa saatat kuulla naksahdavan äänen ja tuntea hieman painetta silmässäsi.

Seuraavaksi lääkärisi suorittaa rutiininomaiset silmätutkimukset varmistaakseen, että lääkkeen annostelu on onnistunut.

Mitä tapahtuu hoitoni jälkeen?

Injektion jälkeen:

- Näkösi saattaa olla sumentunut noin vuorokauden ajan.
- Saatat myös nähdä muutamia lasiaiskellujia tai pisteitä, mikä on normaalia ja tämä loppuu yleensä ajan mittaan.
- Jos nämä oireet eivät häviä tai ne pahenevat, ota yhteys lääkäriisi.
- Jos normaalisti ajat tai käytät koneita, älä aloita uudelleen näitä toimia ennen kuin näkösi on kirkastunut kokonaan.



Mistä löydät lisätietoa lääkkeestäsi

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ozurdex-valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kattava luettelo mahdollisista haittavaikutuksista löytyy pakkausselosteesta, joka tulee Ozurdex-valmisteen mukana.

Lisätietoja lääkkeestäsi saat pakkausselosteesta, joka löytyy myös laakeinfo.fi sivustolta.

Jos haluat lisää kopioita tästä Potilasoppaasta, voit tilata niitä sähköpostitse: info@abbvie.fi tai puhelimitse: 010 2411 200 (vaihde).

Tämän Potilasoppaan digitaalinen versio sekä kuunneltava ääniversio ovat saatavilla pharmacafennica.fi sivustolta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Fimealle tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle (AbbVie Oy):

Lääkkeen turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

AbbVie Oy
p. 010 2411 200
www.abbvie.fi