Descrizione	Data	Cliente	Materiale
0540372	04.10.2023	BAXTER	

N° colori: 4

Formato

GRAY 425C · BAXTER BLUE 7686 · PINK 1915C · GREEN 361C

Grafiche Pradella
PAKKAUSETIKETTI

ANNOSTUSTYÖKALU

Kohtalaisen kivun lyhytaikainen hoito, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikainen hoito, kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti ja/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista.[1]

Antoperiaate. Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen annostustaulukko [1]

Potilaan paino	Annos antokertaa kohti	Tilavuus antokertaa kohti	Maksimitilavuus annostelua kohti perustuen kunkin ryhmän painoylärajaan (ml)*	Maksimiannos vuorokaudessa
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg – ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg, ei yli 2 g
> 33 kg – ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg, ei yli 3 g
> 50 kg jos lisäksi muita riskitekijöitä maksatoksisuudelle	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg jos ei muita riskitekijöitä maksatoksisuudelle	1 g	100 ml	100 ml	4 g

* Potilaat, jotka painavat vähemmän, tarvitsevat pienemmän annostilavuuden.
Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana. Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.
[1] Valmisteyhteenveto, Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos.

1 ml = 10 mg

Potilaan paino: kg
Parasetamolin tilavuus: ml
Parasetamolin määrä: mg

INFUUSIONESTE, LIUOS

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

DOSTL10FI

Lapset, jotka painavat ≤ 10 kg:

- **Näiden potilaiden annos on 7,5 mg/kg.**
- **Tälle painoryhmälle annettava Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 7,5 ml annosta kohti. Alhaisempi paino edellyttää pienempää annostilavuutta.**
- Lasista Paracetamol Baxter -injektiopulloa ei pidä käyttää infuusion antamiseen, koska tälle potilasryhmälle annettava lääkevolyymi on hyvin pieni.
- Sopivan annoksen mittaamiseen suhteessa lapsen painoon ja haluttuun tilavuuteen pitää käyttää 5 ml:n tai 10 ml:n ruiskua.
- Annosteltava määrä on otettava pois injektiopullosta, ja se voidaan antaa joko laimentamattomana tai laimennettuna (yksi osa infuusionestettä korkeintaan yhdeksään osaan laimenninta) 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella. Liuos annostellaan 15 minuutin aikana.

Lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat > 33 kg mutta ≤ 50 kg:

- **Näiden potilaiden annos on 15 mg/kg. Näiden potilaiden maksimiannos vuorokaudessa ei saa olla yli 3 g 24 tunnin aikana.**
- **Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 75 ml annostelua kohti.**

0540372 – ANNOSTUSTYÖKALU BAXTER

Tämä työkalu on osa Paracetamol Baxter -valmisteen riskienhallintasuunnitelmaa, ja sillä pyritään minimoimaan yliannostuksen riski.

Tekstin viimeisin muuttamispäivämäärä: 04.10.2023

Katso lisätietoja Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht,
Alankomaat

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana.

Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.

kg – Potilaan paino	ml – Parasetamolin tilavuus	mg – Parasetamolin määrä
50	75	750
49	73,5	735
48	72	720
47	70,5	705
46	69	690
45	67,5	675
44	66	660
43	64,5	645
42	63	630
41	61,5	615
40	60	600
39	58,5	585
38	57	570
37	55,5	555
36	54	540
35	52,5	525
34	51	510
33	49,5	495
32	48	480
31	46,5	465
30	45	450
29	43,5	435
28	42	420
27	40,5	405
26	39	390
25	37,5	375
24	36	360
23	34,5	345
22	33	330
21	31,5	315
20	30	300
19	28,5	285
18	27	270
17	25,5	255
16	24	240
15	22,5	225
14	21	210
13	19,5	195
12	18	180
11	16,5	165
10	7,5	75
9	6,7	67
8	6	60
7	5,2	52
6	4,5	45
5	3,7	37
4	3	30
3	2,2	22
2	1,5	15
1	0,75	7,5

Vedä

Kohtalaisen kivun lyhytaikainen hoito, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikainen hoito, kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti ja/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista. [1]

[1] Valmisteyhteenveto, Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht,
Alankomaat

Baxter