

Descrizione	Data	Cliente	Materiale
0540372	05.2023	BAXTER	
N° colori	Formato		
4			



Grafiche Pradella

PAKKAUSETIKETTI

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

Lapset, jotka painavat ≤ 10 kg:

- Näiden potilaiden annos on 7,5 mg/kg.
- Tälle painoryhmälle annettava Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 7,5 ml annosta kohti. Alhaisempi paino edellyttää pienempää annostilavuutta.
- Lasista Paracetamol Baxter -injektiopulloa ei pidä käyttää infuusion antamiseen, koska tälle potilasryhmälle annettava lääkevolyyymi on hyvin pieni.
- Sopivan annoksen mittaamiseen suhteessa lapsen painoon ja haluttuun tilavuuteen pitää käyttää 5 ml:n tai 10 ml:n ruiskua.
- Annosteltava määrä on otettava pois injektiopullosta, ja se voidaan antaa joko laimentamattomana tai laimennettuna (yksi osa infuusionestettä korkeintaan yhdeksään osaan laimenninta) 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisellä glukoosiliuoksella. Liuos annostellaan 15 minuutin aikana.

Lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat > 33 kg mutta ≤ 50 kg:

- Näiden potilaiden annos on 15 mg/kg. Näiden potilaiden maksimiannos vuorokaudessa ei saa olla yli 3 g 24 tunnin aikana.
- Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 75 ml annostelua kohti.

Antopöytä. Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen annostusluku (1)

Potilaan paino	Annos antokertaa kohti	Tilavuus antokertaa kohti	Maksimiliuvuus perustuen kunkin ryhmän painovälijäsen (ml) ⁽¹⁾	Maksimiliuvuus vuorokaudessa
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg - ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg, ei yli 2 g
> 33 kg - ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg, ei yli 3 g
> 50 kg jos lisäksi muita riskitekijöitä maksakatsausuudelle	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg jos ei muita riskitekijöitä maksakatsausuudelle	1 g	100 ml	100 ml	4 g

ANNOSTUSTYÖKALU

1 ml = 10 mg

mg - Parasetamolin määrä
ml - Parasetamolin tilavuus
kg - Potilaan paino

Tämä työkalu on osa Paracetamol Baxter -valmisteen riskienhallintasuunnitelmaa, ja sillä pyritään minimoimaan yliannostuksen riski.

Tekstin viimeisin muuttamispäivämäärä: 05.2023

Katso lisätietoja Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Alankomaat

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana.

Potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.

kg - Potilaan paino

50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ml - Parasetamolin tilavuus

75	73,5	72	70,5	69	67,5	66	64,5	63	61,5	60	58,5	57	55,5	54	52,5	51	49,5	48	46,5	45	43,5	42	40,5	39	37,5	36	34,5	33	31,5	30	28,5	27	25,5	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5	0,75
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	---	-----	---	-----	---	-----	------

mg - Parasetamolin määrä

750	735	720	705	690	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450	435	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	7,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

Vedä

Kohtalaisen kivun lyhytaikainen hoito, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikainen hoito, kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti jai/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista. (1)

(1) Valmisteyhteenveto, Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Alankomaat