

PENTHROX[®]

(metoksifluraani)



Tarkistuslista lääkkeen antamista varten

Tämä tarkistuslista sisältää tärkeää tietoa metoksifluraanin turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä tärkeiden riskien asianmukaisesta hallinnasta.

TÄRKEÄÄ TIETOA RISKIEN MINIMOINNISTA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Ennen kuin annat metoksifluraania, tarkista ettei seuraavat koske potilasta:

Sydän- ja verisuonivaivat

Yliherkkyys metoksifluraanille, fluoripitoiselle anestesia-aineelle tai mainituille apuaineille

Tiedossa oleva tai geneettinen alttius malignille hypertermialle, potilaat, joilla on anamneesissa tai sukuanamneesissa tiedossa olevia vaikeita haittavaikutuksia inhaloitavien anestesia-aineiden annon jälkeen

Tajunnan tason aleneminen (myös alkoholin takia)

Munuaisten vajaatoiminta

Tarkista myös:

Alle 18 vuotias

Keuhkojen vajaatoiminta tai hengityslama

Maksan vajaatoiminta

Edellinen metoksifluraanin anto

Jos potilaalla on mikä tahansa tässä luetelluista tiloista tai jos hän käyttää mitä tahansa kääntöpuolella luetelluista lääkeaineista, **ÄLÄ** anna metoksifluraania.

Neuvo potilasta, miten metoksifluraania otetaan oikein.

Muista: Lue valmisteyhteenveto ennen lääkkeen antamista ja anna potilaalle pakkausseloste. Varmista, että potilaalle annetaan pienin tarvittava annos ja ettei 6 ml:n enimmäisannosta (2 x 3 ml:n pulloa) ylitetä.

Potilas ei käytä:

CYP450 entsyymiä indusoivia aineita (esim. alkoholi, isoniatsidi, fenobarbitaali, rifampisiini, karbamatsepiini, efavirentsi tai nevirapiini. Antibiootteja, joilla on tunnetusti munuaistoksisia vaikutuksia (esim. tetrasykliini, gentamisiini, kolistiini, polymyksiini B ja amfoterisiini B).

Metoksifluraanin samanaikainen käyttö keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa saattaa aiheuttaa additiivisia keskushermostoa lamaavia vaikutuksia, ja potilasta on seurattava tarkoin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: Fimea, www.sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA