

PENTHROX[®]

(metoxifluran)



Checklista för administrering

Denna checklista är nödvändig för att säkerställa säker och effektiv användning av metoxifluran och lämplig hantering av viktiga utvalda risker.

VIKTIG INFORMATION FÖR RISKMINIMISERING FÖR VÅRDPERSONAL

Innan användning av metoxifluran kontrollera att patienten inte har:

Kardiovaskulär instabilitet

Överkänslighet mot metoxifluran, fluorerade anestetika eller mot något hjälpämne

Känd eller genetiskt misstänkt känslighet mot malign hypertermi, patienter med en anamnes på eller patienter med en känd familjeanamnes på allvarliga biverkningar efter administrering av inhaled anestetika

Reducerad medvetandegrad (inklusive orsakad av alkohol)

Nedsatt njurfunktion

Kontrollera också:

Ålder under 18 år

Andningsdepression

Nedsatt leverfunktion

Senaste administreringen av metoxifluran

Om patienten lider av några av ovan listade tillstånd eller tar några av läkemedlen listade på baksidan, ge **INTE** metoxifluran.

Instruera patienten hur man korrekt administrerar metoxifluran.

Påminnelse: Läs produktinformationen innan administrering och ge bipacksedeln till patienten. Säkerställ att lägsta nödvändiga dos administreras och att maxdosen 6 ml (2 x 3 ml flaskor per dygn) inte överskrids.

Patienten inte tar:

CYP 450 enzyminducerare (t.ex alkohol, isoniazid, fenobarbital, rifampicin, karbamazepin, efavirenz eller nevirapin.) Antibiotika med känd nefrotisk effekt (t.ex tetracyklin, gentamicin, kolistin, polymyxin B eller amfotericin B).

Samtidig användning av metoxifluran och CNS-depressiva medel kan framkalla additiva hämmande effekter och patienter bör observeras noggrant.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Fimea, webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA