

REBLOZYL® (luspatersepti) POTILASKORTTI

*Tämä potilaskortti on tarkoitettu naisille,
jotka voivat tulla raskaaksi.*

Potilaille:

Reblozyl-valmistetta (luspatersepti) ei saa käyttää raskauden aikana. Reblozylin käyttö on lopetettava kolme (3) kuukautta ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Reblozyl-hoito voi vahingoittaa sikiötä.

Älä käytä Reblozyliä, jos olet raskaana, imetät tai jos voit tulla raskaaksi etkä käytä tehokasta ehkäisyä.

Ennen hoidon aloittamista:

- Raskaustestisi negatiivisen tuloksen tulee olla lääkärin vahvistama.
- Lääkäri käy kanssasi läpi tehokkaita raskauden ehkäisymenetelmiä. Sinun tulee käyttää tehokasta ehkäisyä Reblozyl-hoidon aikana ja kolmen (3) kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Hoidon aikana ja hoidon jälkeen:

Raskaustesti on toistettava Reblozyl-hoidon aikana säännöllisin väliajoin.

Kerro välittömästi lääkärille raskausepäilyistä tai varmistetusta raskaudesta Reblozyl-hoidon aikana sekä seuraavan kolmen (3) kuukauden aikana hoidon päättymisestä.

Lisätietoja saat REBLOZYL-pakkausselosteesta (www.ema.europa.eu) tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

Uuden potilaskortin voit pyytää lääkäriltäsi, tai ladata osoitteesta www.fimea.fi.

Haittavaikutusepäilyt pyydetään ilmoittamaan:

Fimealle: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA tai

Bristol Myers Squibb'n lääkeneuvontaan: puhelimitse 09-25121244 tai sähköpostitse medinfo.finland@bms.com.

Minulle on määrätty Reblozyl-hoito.

Hoitavan lääkäriini yhteystiedot (lääkkeen määrääjä):

Lääkäriin nimi:

Toimipaikka:

Toimipaikan puhelinnumero:

Lisätietoja terveydenhuollon ammattilaisille REBLOZYL-valmisteyhteenvedosta (www.ema.europa.eu) tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.